

INDOMETHACIN REVA SUPPOSITORIES



Composition: Each supp contains Indomethacin 100 mg
Properties: Indomethacin is highly effective non-steroidal anti-inflammatory agent with marked analgesic and antipyretic properties, and it is a potent inhibitor for prostaglandin synthesis in vitro.

Indomethacin has been shown to be an appropriate for long-term use in rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis, and osteoarthritis.

Indomethacin has been found effective in relieving the pain, reducing the fever, swelling, redness, and tenderness of acute gouty arthritis.

Indications : Indomethacin is indicated in the following cases :

- Rheumatoid arthritis
- Moderate to severe juvenile rheumatoid arthritis
- Degenerative joint disease of the hip
- Ankylosing spondylitis
- Osteoarthritis
- Gout

It Is also Indicated for:

- Acute musculoskeletal disorders, such as bursitis, synovitis, tenosynovitis, tenositis, capsulitis of the shoulder-blade, sprains and strains.
- Low back pain (lumbago)
- Fever (as a short term adjunct to specific therapy)
- Pain and inflammation following dental operations.
- Inflammation, pain, and swelling following procedures associated with reduction and immobilization of fractures or dislocations.
- Pain associated with symptoms of primary dysmenorrhea .

Contra-indications : Indomethacin should not be used in the following cases :

- Hypersensitivity to any components of this product.
- Patients who have acute asthmatic attack, or allergic rhinitis due to aspirin or other non-Steroidal anti-inflammatory agents.
- It should not be given in patients with peptic ulcer or with a recurrent history of gastro intestinal ulceration

Indomethacin is not recommended during pregnancy or lactation, and it should not be given to children.

Indomethacin is not recommended in patients with history proctitis or recent rectal Bleeding .

Drug interactions:

diflunisal and salicylates with Indomethacin should not be used concomitantly .

Indomethacin when used concomitantly with probenecid or methotrexate, the dosage should be decreased.

Indomethacin should not be used concomitantly with captopril, anti-coagulation, beta blockers, cyclosporine.

Precautions:

- should be used with caution in patients with psychiatric problems, Parkinsonism, or epilepsy.
- should be used with caution in patients with cardiac disorders, hypertension, renal or liver toxicity.
- should be used with care in the aged .

Side effects :

- Central nervous system(headache, accompanied sometimes by dizziness) .

- Cardiovascular : Fluid retention and edema

- Allergic reactions : skin rash, urticaria

- In rare cases, administration of Indomethacin supp. may causes tenesmus or Irritation of mucosa

Dosage & Administration: (1-2) supp per day in divided doses as clinical state .

Storage conditions : Store in a dry place below 25° C

Packaging : Box contains (10) supps.

-A medicament is a product which affects your health, and it's consumption contrary to instructions is dangerous for you.
- Follow strictly the doctors prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medicament.
-The doctor and the pharmacist experts in medicine, it's benefits and risks.
-Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.
KEEP THE MEDICAMENTS OUT OF REACH OF CHILDREN
Council of Arab Health Ministers& Union of Arab Pharmacists

Reva Pharmaceutical Industry - Syria



اندوميتاسين - ريفا تحاميل

التركيب: كل تحميلة إندوميتاسين ريفا تحتوي على إندوميتاسين ١٠٠ ملغ.
الخصائص: إندوميتاسين هو عامل مضاد للالتهاب لا ستيرويدي عالي الفعالية مع خصائص هامة مسكنة وخافض للحرارة، وهو مثبط قوي لتركيب البروستاغلاندين.

ثبت أن إندوميتاسين مناسب للاستخدام على المدى الطويل في التهاب المفاصل الرثياني، والتهاب الفقار اللاصق، والفصال العظمي.

وجد أن إندوميتاسين فعال في تخفيف الألم، وتخفيف الحرارة، والتورم والاحمرار، والالام في التهاب المفاصل النقرسي الحاد.

الاستطبابات: يستطب إندوميتاسين في الحالات التالية:

- التهاب المفاصل الرثياني
- التهاب المفاصل الرثياني الشبائي المعتدل إلى الشديد
- التهاب الفقار اللاصق
- داء المفاصل التنكسي في الورك
- التهاب الفقار الرثياني
- النقرس

كما أنه يستطب ل:

- الاضطرابات العصبية الهيكلية الحادة، مثل التهاب الجراب، التهاب الغشاء الزليلي، التهاب غمد الوتر
- التهاب الوتر، التهاب محفظة الكتف، وحالات اللوي واللوي.

• آلام أسفل الظهر (الألم القطني)

• الحمى (كمعالجة إضافية على المدى القصير للعلاج النوعي)

• الألم والالتهاب التالي للعلاجات السنية.

• الالتهاب والألم والتورم التالي للإجراءات المترافقة مع إرجاع وتثبيت الكسور أو الخلع.

• الألم المصاحب لأعراض عسر الطمث الأولي.

مضادات الاستطباب: لا ينبغي استخدام الإندوميتاسين في الحالات التالية:

- فرط الحساسية لأحدى مكونات المنتج.
- المرضى الذين يعانون من التهاب الربو الحاد، أو التهاب الأنف التحسسي بسبب الأسبرين أو غيره من مضادات الالتهاب غير الستيرويدي.

• يجب عدم إعطائه للمرضى الذين يعانون من قرحة هضمية أو قصة سابقة لتقرح معدي معوي.

• لا ينصح إندوميتاسين أثناء الحمل والإرضاع ولا يعطى للأطفال.

• لا ينصح استخدام إندوميتاسين في حالات المرضى الذين يعانون من التهاب المستقيم أو نزيف مستقيمي حديث.

التداخلات الدوائية:

لا ينبغي استخدام الديفلونيزال و الساليسيلات مع إندوميتاسين في نفس الوقت.

يجب تقليل الجرعة عند استخدام الإندوميتاسين بالتزامن مع البروبيينسيد أو الميثوتريكسيات .

ينبغي عدم استخدام الإندوميتاسين مع كابوبريل ومضادات التخثر وحاصرات البيتا وسيكلوسبورين.

التحذيرات:

• يجب أن يستخدم بحذر عند المرضى الذين يعانون من مشاكل نفسية أو باركنسونية أو الصرع.

• يجب أن يستخدم بحذر عند المرضى الذين يعانون من اضطرابات قلبية أو ارتفاع ضغط الدم وسمية كبدية أو كلوية.

• يجب أن يستخدم بحذر لدى المسنين.

الآثار الجانبية:

• الجهاز العصبي المركزي: صداع مصحوب بالدوار أحياناً

• القلب والأوعية الدموية: احتباس السوائل وذمة

• ارتكاسات أرجية: طفح جلدي، شرى

• في حالات نادرة إعطاء الإندوميتاسين قد يسبب زحيراً أو تهيج الغشاء المخاطي.

الجرعة: (١-٢) تحميلة يومياً مقسمة على جرعات.

شروط الحفظ: تحفظ في مكان جاف تحت ٢٥ درجة مئوية.

التعبئة: عبوة تحتوي على (١٠) تحاميل.

الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستعمله وفقاً للتعليمات بعرفك للحظر
اتب بدقة وصفة الطبيب بطريقة الاستعمال المخصوص عليها وتعليمات الصيدلي
الذي صرفها لك ، فالتطبيب الصيدلي لها الدوران في الدواء ونفعه وضروءه.
تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية.
لا تترك الأدوية يتناول أيدي الأطفال
مجلس وزراء الصحة العرب واتحاد الصيدلة العرب

إنتاج شركة ريفا للصناعات الدوائية - سوريا