



شراب

أزمالين

التركيب: كل ٥ مل شراب أزمالين تحتوي:
برومهيكسين هيدروكلوريد ٤ ملغ
غوايفينيزين ٥٠ ملغ
كبريتات تيربوتالين ١,٢٥ ملغ
منول ٢,٥ ملغ.

الخصائص الدوائية:

- برومهيكسين هيدروكلوريد: عامل حال للبلغم (يقفل من لزوجة إفرازات الشعب الهوائية).
- غوايفينيزين: مقشع، يخفف من احتقان الصدر والحلق (يساعد على التخلص من الإفرازات القصبية من خلال السعال).

- كبريتات تيربوتالين: موسّع قصبي (يقوم بتوسيع الشعب الهوائية مما يجعل التنفس أسهل).
الإستطبابات:

- يستخدم أزمالين للحالات التي يتواجد فيها الكثير من المخاط السميك في الشعب الهوائية.
- يعمل أزمالين عن طريق تخفيف سماكة المخاط في الشعب الهوائية، مما يجعل المخاط أقل لزوجة وبالتالي يسهل إزالة المخاط.

- يستخدم هذا المستحضر للتخفيف السري من السعال المرتبط بالتهاب الشعب الهوائية، علاج السعال المرتبط بالتهاب القصبات الحاد والمزمن، الربو القصبي، انتفاخ الرئة وغيرها من الإضطرابات الرئوية - القصبية حيث يتواجد بشكل مرافق للتشنج القصبي، السعال الرئوي وغيرها من الإضطرابات الشعبوية التشنجية، التدخين الفعال والسليبي، إنسداد مخاطي ومشاكل في التنفس.

مضادات الإستطباب:

شراب أزمالين هو مضاد استطباب في الحالات التالية:

- فرط الحساسية المعروفة لأي من مكونات المستحضر.

- اضطراب نظم القلب.

- خلل الوظيفة الكبدية.

- قرحة المعدة والإثني عشر.

- الميل للزيف.

التحذيرات والإحتياطات:

لا يستخدم شراب أزمالين في حال:

- المريض الذي يتناول مثبطات مونو أمين أوكسيداز (MAOI)، أدوية معينة للاكتئاب،

أو لمدة أسبوعين بعد إيقاف الأدوية المثبطة لمونو أمين أوكسيداز.

- المرضى الذين يتناولون المركبات أو المهدئات.

إيقاف الإستخدام وطلب مشورة طبية في حال:

- عصبية، دوخة، أو أرق.

- استمرار السعال أو احتقان الأنف لأكثر من أسبوع، أو ميله إلى التكرار، أو

مصاحبته للحمى، الطفح أو الصداع المستمر.

قد يكون السعال المستمر علامة على وجود حالة خطيرة.

- حدوث أعراض جديدة.

أسأل الطبيب قبل الاستخدام إذا كان المريض يعاني من:

- زرق.

- مرض قلبي (ارتفاع ضغط الدم).

- مرض في الغدة الدرقية.

- السكري.

- صعوبة في التبول بسبب تضخم البروستات.

التأثيرات الجانبية: تتضمن التأثيرات الجانبية:

هضمية: غثيان، إقياء، عسر الهضم، الإسهال.

قلبية - وعائية: خفقان، تسرع قلب.

عصبية: دوخة، صداع، ونعاس.

الحمل والإرضاع:

الحمل: يجب استخدام الدواء بحذر أثناء الحمل.

الإرضاع: يُستخدم المستحضر فقط إذا كانت فوائده تفوق المضار المحتملة على الرضيع.

الجرعة والإستعمال:

البالغين والأطفال فوق ١٢ سنة: ١٠ مل (ملعقتان صغيرتان) كل ٤ ساعات.

الأطفال ٦ سنوات إلى ١٢ سنة: ٥ مل (ملعقة صغيرة) كل ٤ ساعات.

يجب ألا تتجاوز ٦ جرعات خلال ٢٤ ساعة.

شروط الحفظ: يحفظ بدرجة حرارة الغرفة ، دون ٣٠°م.

التعبئة: زجاجة عاتمة سعة ١٠٠ مل.

الدواء مستحضر يأت على صفة استعمله خلافاً للتعليمات بعرضك للخطر
اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الإستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلي
التي صرفها لك ، فالطبيب والصيدلي هما المختصان في الدواء وبتلغهم وضرره.
لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية
لا تتركه الأدوية بمنزلك أبداً للأطفال
مجلس وزراء الصحة العرب واتحاد الصيدلة العرب.

إنتاج شركة ريفا للصناعات الدوائية - سوريا

AZMALIN Syrup



Composition: Each 5 ml AZMALIN Syrup contains:

Bromhexine Hydrochloride	4 mg,
Guaifenesin	50 mg,
Terbutalin Sulphate	1.25 mg,
Menthol	2.5 mg.

Pharmacological Properties:

- Bromhexine Hydrochloride: Mucolytic Agent (reduces the viscosity of bronchial secretions).
- Guaifenesin: an expectorant, relieves congestion of the chest and throat (helps to eliminate bronchial secretions through coughing).
- Terbutaline sulfate: bronchodilator (expands the airways, making breathing easier).

Indications:

- AZMALIN is used for cases where there is a lot of thick mucus in the airways.
- AZMALIN works by thinning the mucus in the airways, making the mucus less sticky and thus easier to remove the mucus.
- This preparation is used for the clinical relief of cough associated with bronchitis, treatment of cough associated with bronchitis. Acute and chronic bronchial asthma, emphysema and other pulmonary - bronchial disorders as it is present in association with bronchospasm, Pulmonary tuberculosis and other spastic bronchial disorders, active and passive smoking, mucosal obstruction and expectoration problems.

Contraindications:

AZMALIN Syrup is contraindicated with:

- known hypersensitivity to any component of the syrup.
- Cardiac rhythm disorder.
- Disorder of hepatic function.
- Peptic ulcer of stomach and duodenum.
- Tendency to bleeding.

Warnings Precautions:

Do not use this product to:

- The patient who is taking a prescription monoamine oxidase inhibitor

(MAOI), certain drugs for depression, psychiatric or emotional conditions or Parkinson's disease or for 2 weeks after stopping the MAOI drug.

- Patients Taking sedatives or tranquilizers.

Stop use and ask a doctor if:

- Nervousness, dizziness, or sleeplessness occur.
- Cough or nasal congestion persists for more than 1 week, tends to recur, or is accompanied by a fever, rash or persistent headache. A persistent cough may be a sign of a serious condition.
- New symptoms occur.

Ask a doctor before use if the patient has:

- Glaucoma.
- Heart disease (high blood pressure).
- Thyroid disease.
- Diabetes.
- Difficulty in urination due to enlargement of the prostate gland.

Side Effects:

Side effects include:

- Digestive: nausea, vomiting, indigestion, diarrhea.
- Cardiovascular: palpitations, tachycardia.
- Nervousness: dizziness, headache, and drowsiness.

Pregnancy and Lactation:

Pregnancy: The drug is to be carefully used during pregnancy.

Lactation: Use only the product if the potential benefits to the patient are weighed against the possible risk to the infant.

Dosage and administration:

Adults and children over 12 years: 10 ml (2 teaspoons) every 4 hours.

Children 6 to 12 years: 5 ml (1 teaspoon) every 4 hours.

You should not exceed 6 doses in 24 hours.

Storage: Store at room temperature, Below 30 °C.

Packaging: Carton package contains 100 ml glass bottle.

-A medication is a product which affects your health, and it's consumption contrary to instructions is dangerous for you.
- Follow strictly the doctor's prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medication.
-The doctor and the pharmacist experts in medicine, it's benefits and risks.
-Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.
KEEP THE MEDICAMENTS OUT OF REACH OF CHILDREN
Council of Arab Health Ministers & Union of Arab Pharmacists

Reva Pharmaceutical Industry - Syria