

Bactrisept

D.S Tablet
Oral Suspension



Composition: Each tablet contains 160mg Trimethoprim and 800mg Sulphamethoxazole. Each 5ml of Suspension contains 40mg Trimethoprim and 200 mg Sulphamethoxazole

Characteristics:

This is a broad-spectrum antibacterial drug containing Trimethoprim and Sulfamethoxazole in a 1:5 fixed combination. Bactrisept exerts its bactericidal action By the sequential blockade of two bacterial enzyme systems in the biosynthesis of Folic acid in the micro-organisms. The synergy thus produced accounts for the high degree of bactericidal activity.

Indications: Bactrisept is bactericidal in vitro to a wide range of Gram-positive and Gram, negativen organisms. Indications include:

- Respiratory tract infections: Acute and chronic bronchitis (treatment and prophylaxis), bronchiectasis, lung abscess, lobar and broncho-pneumonia, Pneumocystis carinii pneumonitis, sinusitis and otitis media.
- Genito-urinary tract infections: Urethritis, acute and chronic cystitis, pyelitis, pyelonephritis and prostatitis, gonorrhea.
- Gastro-intestinal tract: Infections, caused by S. typhi and S. paratyphi, including chronic carrier state.
- Others: Infections, caused by a wide range of organisms confirmed to be susceptible to Bactrisept. Such infections include acute and chronic osteomyelitis, acute brucellosis, skin infections including pyoderma, abscesses and wound infections, septicemia, bacillary dysentery and cholera (as an adjuvant to fluid and electrolyte replacement), nocardiosis and mycetoma.

Dosage & Administration: Duration of therapy: In acute infections (apart from gonorrhea) Bactrisept should be given for at least 5 days or until the patient has been symptom free for 2 days. Treatment for prostatitis and acute brucellosis should be maintained for a period of at least 4 weeks, whilst nocardiosis and mycetoma, dosage guideline requires long-term therapy.

Adults: The usual adult dosage is one tablet every 12 hours.

Pediatric Patients: The recommended dose for pediatric patients is 8 mg/kg trimethoprim and 40 mg/kg sulfamethoxazole per 24 hours, given in two divided doses every 12 hours.

Contraindicated in pediatric patients less than 2 months of age.

Side Effects: Crystalluria, allergic reactions, hemolysis, thrombocytopenia, neutropenia, agranulocytosis, have been reported rarely. Other side effects, less serious in nature are malaise, headache, nausea, vomiting. These are normally transient and do not require withdrawal of treatment.

Warning & Precautions: Prolonged full dose treatment with Sulphamethoxazole-Trimethoprim combination is associated with the risk of macrocytic anemia due to the drug's interference in the conversion of Folic acid into Folinic acid. Care should be taken when giving this combination to diabetic patients receiving sulphonylurea drug for possible potentiation of action of sulphonylurea.

Pregnancy & Lactation: It should be avoided during pregnancy and lactation because sulphonamides pass the placenta and are excreted in the breast milk and may cause kernicterus.

Contraindications: It is contraindicated in known hypersensitivity to Trimethoprim or Sulphonamides, in patients with documented megaloblastic anemia due to folate deficiency and in patients showing marked liver parenchymal damage, blood dyscrasia, severe renal insufficiency, glucose 6-phosphate dehydrogenase deficiency.

Storage: Do not store above 25°C. Protect from light.

Packaging: Bactrisept Tablet: Box containing 2 blister strips of 10 tablets.

Each tablet contains 160mg Trimethoprim and 800mg Sulphamethoxazole.

Bactrisept Suspension: 100 ml suspension in amber glass bottle. Each 5ml of Suspension contains 40mg Trimethoprim and 200mg Sulphamethoxazole.

-A medicament is a product which affects your health, and it's consumption contrary to instructions is dangerous for you.
- Follow strictly the doctors prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medicament.
-The doctor and the pharmacist experts in medicine, it's benefits and risks.
-Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.
KEEP THE MEDICAMENTS OUT OF REACH OF CHILDREN
Council of Arab Health Ministers & Union of Arab Pharmacists

Revapharmaceutical Industry - Syria



مضغوظات مضاعفة المفعول
معلق فموي

باكتريسيبت

الترييب : تحتوي كل مضغوظة على: ١٦٠ مغ ترييموبريم، و ٨٠٠ مغ سلفاميتوكسازول.
معلق: تحتوي كل ٥ مل من المعلق على: ٤٠ مغ ترييموبريم، و ٢٠٠ مغ سلفاميتوكسازول.

الخواص : باكتريسيبت مضاد للجراثيم، واسع الطيف، يحتوي على ترييموبريم و سلفاميتوكسازول بنسبة ١ إلى ٥، ويعطي مفعوله المضاد للجراثيم عن طريق تثبيط جملتين انزيميتين تعملان على تصنيع حامض الفوليني في العضيات الدقيقة، كما أن تأثر مفعول المادتين الداخلتين في تركيب باكتريسيبت يفسر فعالته الشديدة في قتل الجراثيم.

الاستطبابات : باكتريسيبت قاتل للجراثيم (في الزواج) ويؤثر على طيف واسع من الجراثيم ايجابية وسلبية الغرام، وتتضمن استطباباته:

أ- أخماج الجهاز التنفسي: التهاب القصبات الهوائية الحاد والمزم (علاجاً ووقاية)، توسع القصبات، الخراج الرئوي، ذات الرئة الفصية، ذات الرئة القصبية، الالتهاب الرئوي بالمكتسية، التهاب الجيوب الأنفية، والتهاب الأذن الوسطى.

ب- أخماج المجاري البولية والتناسلية: التهابات الإحليل، التهابات المثانة الحادة والمزمنة، التهاب الحويضة، التهاب الحويضة الكلوية، التهاب البروستات، والسيلان البني.

ج- أخماج القناة المعوية: السالمونيلا التيفية ونظيرة التيفية، بما في ذلك الحالات المزمنة الكامنة.

د- أخماج أخرى: قد يسببها طيف واسع من الجراثيم التي يؤثر فيها باكتريسيبت: التهابات العظم والنقي الحادة والمزمنة، البروسيلة الحادة، الأخماج الجلدية: تقيع الجلد، الخراجات وأخماج الجروح، وخمج الدم، والزحار العصوي، والكوليرا (كعلاج موازي لاستعاضة السوائل والشوارد)، داء النوكارديا، والميسيتوما (الورم الفطري).

الجرعة والاستخدام : مدة الاستخدام: في الأخماج الحادة (عدا السيلان) يجب أن يعطى باكتريسيبت على الأقل لمدة ٥ أيام، وحتى بعد زوال الأعراض ببوامين، في علاج التهاب البروستات والبروسيلة الحادة: يجب أن يستمر العلاج لمدة ٤ أسابيع على الأقل، أما في حالتي: النوكارديا والميسيتوما (الورم الفطري) فإن المراجع السريرية تنصح بفترة علاج طويلة الأمد.

للبالغين: الجرعة الاعيادية هي: مضغوظة واحدة مضاعفة المفعول كل ١٢ ساعة.
للأطفال والرضع: الجرعة المقترحة هي: ٨ مغ / كغ ترييموبريم، و ٤٠ مغ / كغ سلفاميتوكسازول (طبعاً محسوبة على كل كغ من وزن الجسم)، على جرعتين يومياً كل ١٢ ساعة.

لايعطى للرضع دون العمر شهرين.

التأثيرات الجانبية : لوحظت كل من الأعراض التالية بشكل نادر: بيلة البلورات، انحلال الدم، ندرة الصفائح، ندرة العدلات، ندرة المحببات، وتتضمن التأثيرات الجانبية الأخرى: التورك والصداع والغثان والإقياء، وهي عادة أعراض عابرة تزول بعد توقف استخدام الدواء.

التحذيرات والاحتياطات : إن الاستخدام طويل الأمد للسلفاميتوكسازول والترييموبريم يترافق مع خطر حدوث مرض فاقات الدم العرطلة، بسبب تدخل المادتين الفعالتين في تحويل حمض الفوليك إلى الفوليني، كما يجب الحذر عند إعطاء هذا الدواء لمرضى السكري الذين تتم معالجتهم بمركبات السلفونيل يوريا بسبب تقويته لتأثير مركبات السلفونيل يوريا.

الحمل والإرضاع : يجب عدم إعطاء هذه الدواء أثناء الحمل والإرضاع لأن السلفوناميدات تعبر حاجز المشيمة، ويتم طرحها في حليب الأم بما قد يؤدي لليرقان النووي.

مضادات الاستطباب : لايستطاب هذا الدواء عند المرضى الذين لديهم حساسية للترييموبريم أو السلفوناميدات، أو مرضى فاقات الدم العرطلة، أو مرضى الأذية الكبدية، أو مرضى الاعتلالات الدموية، أو مرضى القصور الكلوي الحاد، أو مرضى عوز أنزيم جوكوز ٦ فوسفات ديهيدروجيناز.

التخزين : يحفظ في مكان جاف بدرجة حرارة لا تتجاوز ٢٥°م، بعيداً عن الضوء.
التعبئة : باكتريسيبت مضغوظات: عالية تحتوي ظرفين في كل منها ١٠ مضغوظات.

تحتوي كل مضغوظة مضاعفة المفعول على: ١٦٠ مغ ترييموبريم، و ٨٠٠ مغ سلفاميتوكسازول.
باكتريسيبت معلق: ١٠٠ مل معلق في زجاجة عاتمة

تحتوي كل ٥ مل من المعلق على: ٤٠ مغ ترييموبريم، و ٢٠٠ مغ سلفاميتوكسازول.

الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستعمله خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.
اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال الممنوع منها عليها وتعليمات الصيدلي الذي صرفها لك ، فالطبيب والصيدلي هما الخبيران في الدواء وينبغي وضرره.
لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية.
لا تترك الأدوية بمقتول أيدي الأطفال .
مجلس وزراء الصحة العرب واتحاد الصيدلة العرب.

إنتاج شركة ريفا للصناعات الدوائية - سوريا