

FLU-SAFE

Capsules



Composition:

FLU-SAFE Capsule: Each Capsule contains Paracetamol 240 mg + Chlorpheniramine maleate 3.2 mg + Ascorbic acid 100 mg.

Properties:

FLU-SAFE has an effect decongestant on the upper respiratory tract (Chlorpheniramine maleate an antihistamine for H1 central and peripheral receptors), (Paracetamol an analgesic, antipyretic action; therefore it is suitable to relief the cold symptoms of upper respiratory tract), The combination of vitamin C increases the immunity of the patient.

Indications:

FLU-SAFE is indicated to treat the symptoms of nasal congestion and obstruction rhinorrhea, fever, acute congestive or allergic rhino-pharyngitis, rhinitis, sinusitis, pharyngitis, catarrh.

Contraindications:

Patients allergic to any of the drug components, Severe hepatic failure, Closed angle glaucoma, Patients with the risk of renal retention (urethra-prostatic problems), Children less than 5 years.

Side Effects:

drowsiness, gastrointestinal disturbances, dry mouth, And rarely skin allergic reaction.

Drug Interaction:

Don't take FLU-SAFE with antihypertensive agent or

CNS inhibitors.

Warnings and Precaution:

Avoid driving motor vehicle or operating machinery. avoid alcoholic beverages.

do not exceed the prescribed dose.

The condition should be reassessed if symptoms persist for more than 5 days.

Pregnancy and Lactations:

Pregnancy: Give safety to pregnant women.

Lactations: Chlorpheniramine maleate secreted into lactated mother milk, It is given with caution to nursing women.

Dosage and Administration:

Adults: 1- 2 capsule three times daily.

Children 10- 15 years: 2- 3 capsules daily according to age.

Children 5 -10 years: 1- 2 capsule daily according to age.

Storage:

Store in a dry place at a temperature not exceeding 25°C, away from light.

Packaging:

FLU-SAFE Capsule A box of 20 capsules in two blister.

-A medicament is a product which affects your health, and it's consumption contrary to instructions is dangerous for you.
- Follow strictly the doctors prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medicament.
-The doctor and the pharmacist experts in medicine, it's benefits and risks.
-Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.
KEEP THE MEDICAMENTS OUT OF REACH OF CHILDREN
Council of Arab Health Ministers & Union of Arab Pharmacists

Reva Pharmaceutical Industry - Syria



ريفيا فارما

فلو-سيف كبسول

التركيب:

كل كبسولة فلو-سيف تحتوي: باراسيتامول ٢٤٠ ملغ + كلورفينيرامين ماليات ٣,٢ ملغ + حمض الأسكوربيك ١٠٠ ملغ

الخواص:

يتميز فلو-سيف بتأثير مضاد احتقان للطرق التنفسية (كلورفينيرامين ماليات: مضاد هستامين لمستقبلات H1 المركزية والمحيطية)، (باراسيتامول مسكن للألم خافض للحرارة مما يجعله مناسباً لتخفيف الأعراض المرضية للتهابات الطرق التنفسية العلوية)، كما أن وجود فيتامين ث يميز هذا المستحضر بتأثير مقوي للمناعة.

الاستطبابات:

يستخدم فلو-سيف في معالجة أعراض الاحتقان والانسداد الأنفي، سيلان الأنف، ارتفاع الحرارة، الصداع، معالجة الهجمات الحادة للتهاب الأنف الإحتقاني أو التحسسي، التهاب الجيوب، التهاب البلعوم، النزلة الصدرية.

مضادات استطباب:

فرط الحساسية لأي من مكونات المستحضر، المرضى المصابين بقصور كبدي شديد، المرضى المصابين بالزرق مغلق الزاوية، الأشخاص المؤهين لحدوث انحباس بولي (اضطرابات في الاحليل أو البروستات)، الأطفال الأقل من ٥ سنوات.

التأثيرات الجانبية:

نعاس، اضطرابات هضمية، جفاف الفم، وبشكل نادر اضطرابات جلدية تحسسية.

التداخلات الدوائية:

يجب الحذر عند تناول فلو-سيف مع الأدوية الخافضة للضغط،

والأدوية المثبطة للجملعة العصبية المركزية.
التحذيرات والاحتياطات:

تجنب قيادة السيارة واستخدام الآلات.

تجنب تناول المشروبات الكحولية.

عدم زيادة الجرعة الموصى بها.

يجب إعادة تقييم الحالة في حال استمرار الأعراض لأكثر من ٥ أيام.

الحمل والإرضاع:

الحمل: يعطى بشكل آمن للنساء الحوامل.

الإرضاع: يُفَرز كلورفينيرامين ماليات في حليب الأم المرضع،

يعطى بحذر للنساء المرضعات.

الجرعة والاستخدام:

البالغين: ٢-١ كبسولة ثلاث مرات يومياً.

الأطفال من عمر ١٠ إلى ١٥ سنة: ٢-٣ كبسولة يومياً حسب

العمر.

الأطفال من عمر ٥ إلى ١٠ سنة: ٢-١ كبسولة يومياً حسب

العمر.

التخزين:

يحفظ في مكان جاف بدرجة حرارة لا تتجاوز ٢٥ م°، بعيداً عن

الضوء.

التعبئة:

فلو-سيف كبسول : علبة تحتوي على ٢٠ كبسولة في ظرفين.

الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستعمله خلافاً للتعليمات بعرضك للخطر
اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال الممنوعين عليها وتعليمات الصيدلي
الذي صرفها لك ، فاطبيب و الصيدلي هما الخبيران في الدواء وينقعه وضروه
لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية
لا تترك الأدوية بمقتول أيدي الأطفال
مجلس وزراء الصحة العرب واتحاد الصيدلة العرب

إنتاج شركة ريفيا للصناعات الدوائية - سوريا