

Maternavit Spansule Capsules

RP
Reva Pharma

composition

each capsule contain: Dried ferrous sulfate 150 mg (equivalent to 47 mg elemental iron), Folic Acid 500 micrograms.

Therapeutic indications

Maternavit is a haematinic preparation for prophylaxis and treatment of iron deficiency and prophylaxis of folic acid deficiency during pregnancy.

method of administration

Dosage

Adults only: one capsule a day during pregnancy. Some pregnant patients may need a higher dose of iron because of dietary or other factors.

Children and elderly: not recommended.

The capsules should not be sucked, chewed or kept in the mouth, but swallowed whole with water.

Capsules should be taken before meals or during meals, depending on gastrointestinal tolerance.

Contraindications

Hypersensitivity to any ingredients in the formulation; patients receiving repeated blood transfusions; concomitant parenteral iron; haemochromatosis and other iron overload syndromes.

Special warnings and precautions for use

Administer with caution in patients with haemolytic anaemia, haemoglobinopathies, iron storage or iron absorption diseases, existing gastrointestinal disease.

Interaction with other medicinal products

Concurrent administration with tetracyclines may impair absorption of both agents. The absorption of ciprofloxacin, norfloxacin and ofloxacin and bisphosphonates is reduced by oral iron. Cholestyramine may bind iron to the gastrointestinal tract, thus preventing its absorption.

The absorption of iron salts is also decreased in the presence of antacids, preparations containing zinc, calcium, phosphorus, trientine, or when taken with tea, coffee, milk, eggs and whole grains.

Iron supplements should not be taken within one hour before or two hours after ingestion of these products.

Iron salts may reduce the bioavailability of methyl dopa. The absorption of levodopa and penicillamine may be reduced. Absorption of iron salts is enhanced by ascorbic acid and meat.

Dimercaprol: Avoid the concomitant use of iron with dimercaprol.

Thyroid hormones: Oral iron reduces the absorption of levothyroxine (thyroxine) thus should be given at least 2 hours apart.

Pregnancy and lactation

Pregnancy

There are no known hazards to the use of folic acid in pregnancy, supplements of folic acid are often beneficial.

Lactation

Folic acid is actively excreted in human breast milk. No adverse effects have been observed in breast fed infants whose mothers were receiving folic acid.

Ferrous salts are recommended for use in pregnancy and lactation, and no contraindications to such are known.

Storage

Store in a dry place at a temperature not exceeding 25° C and protect from light.

Packaging

Carton box contain 2 blisters containing 10 Spansule capsules.

-A medicament is a product which affects your health, and it's consumption contrary to instructions is dangerous for you.
- Follow strictly the doctors prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medicament.
-The doctor and the pharmacist experts in medicine, it's benefits and risks.
-Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.
KEEP THE MEDICAMENTS OUT OF REACH OF CHILDREN
Council of Arab Health Ministers & Union of Arab Pharmacists

Reva Pharmaceutical Industry - Syria

RP
ريفا فارما

ماتيرنا - فيت كبسولات سبانسول

تحتوي كل كبسولة على سلفات الحديد الجافة ١٥٠ مغ (بما يعادل ٤٧ مغ من الحديد العنصري)، و ٥٠٠ ميكرو غرام من حمض الفوليك.

الاستطبابات العلاجية

يستخدم ماتيرنا - فيت في الوقاية والعلاج من عوز الحديد، والوقاية من عوز حمض الفوليك أثناء الحمل.

طريقة الاستخدام

الجرعة:

للبالغين فقط: كبسولة واحدة يومياً أثناء الحمل، لكن بعض المرضى قد يحتاجون جرعات أعلى بسبب عوامل أخرى.

لاينصح باعطاء ماتيرنا - فيت للأطفال وكبار السن.

يجب عدم مص أو مضغ الكبسولة أو تركها بالفم، إنما يجب بلعها كاملة مع الماء.

يجب تناول الكبسولة قبل أو أثناء وجبات الطعام حسب تحمل المعدة.

مضادات الاستطباب

فرط الحساسية لأي من مكونات ماتيرنا - فيت، مرضى نقل الدم المتكرر، الاستخدام المترافق لإعطاء الحديد الوريدي، الاضطباب الدموي الوراثي أو متلازمات فرط الحديد الأخرى.

تحذيرات خاصة واحتياطات الاستخدام

يعطى بحذر لمرضى فقر الدم الانحلالي، و مرضى اعتلال الهيمو غلوبين، و مرضى امتصاص أو اختزان الحديد، وأمراض الأمعاء والمعدة.

التداخلات الدوائية

إن الاستخدام المتزامن للتتراسيكلينات مع ماتيرنا - فيت يعيق امتصاص كل منهما، كما يتناقص امتصاص كل من: السيبر وفلو كساسين والنورفلوكزاسين والأوفلو كزاسين والبيز فوسفونات مع تناول الحديد فموياً، كما يخلب الكوليستيرامين الحديد في القناة المعدية المعوية بشكل يمنع امتصاصه.

كما يتناقص امتصاص أملاح الحديد عند تناولها المتزامن مع: مضادات الحموضة أو المستحضرات التي تحوي الزنك أو الكالسيوم أو الفوسفور أو التريانتين، أو عند تناولها مع الشاي أو القهوة أو الحليب أو البيض والحبوب الكاملة (غير المقشورة)، لذلك يجب عدم إعطاء الحديد كمكمل غذائي إلا قبل ساعة أو بعد ساعتين من تناول المواد المذكورة أعلاه.

يمكن أن تؤدي أملاح الحديد على نقص التوافر الحيوي للميتيل دوبا، كما يمكن أن يؤدي إلى تناقص امتصاص الليفودوبا والبنيسيلامين، ويزداد امتصاص الحديد بتناوله بشكل متزامن مع حمض الأسكوربيك واللحم.

الديمير كابرول: يمنع استخدام الحديد المتزامن مع الديمير كابرول.

هرمونات الدرق: يؤدي تناول الحديد فموياً إلى تناقص امتصاص الليفوتيروكسين، لذلك يجب إعطاؤه بفارق زمني مقدار ساعات.

الحمل والرضاع

الحمل: لا توجد أية خطورة من تناول حمض الفوليك لدى الحامل، بل هو عادة مفيد لها.

الرضاع: يتم تناول حمض الفوليك في حليب الأم، ولم يحدث أية تأثيرات جانبية عند الرضع الذين تتناول أمهاتهم حمض الفوليك.

وينصح باستخدام أملاح الحديد عند الحوامل والمرضعات ولا توجد أية مضادات استطباب معروفة لذلك.

التخزين

يحفظ في مكان جاف بدرجة حرارة لا تتجاوز ٢٥ °م، بعيداً عن الضوء.

التعبئة

علبة تحتوي ظرفين في كل منها ١٠ كبسولات سبانسول .

الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستعماله خلافاً لتعليمات برفقك الخطر
اتبع بدقة وصيغة الطبيب وطريقة الاستعمال المخصوص عليها وتعليمات الصيدلي
الذي صرفها لك ، فالطبيب والصيدلي هما الخبيران في الدواء وفعله وضرره .
-تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية .
-لا تترك الأدوية يتناول أيدي الأطفال .
محلى وزراء الصحة العرب واتحاد الصيدلة العرب .
إنتاج شركة ريفا للصناعات الدوائية - سوريا