

METROCEPT

Vaginal Ovules



Each ovule contains: Metronidazole 500 mg, Miconazole as nitrate 150 mg.

Indication : Treatment of vaginal candidiasis due to Candida albicans, bacterial vaginitis due to anaerobic bacteria & in trichomonal vaginitis due to Trichomonas vaginalis & in mixed vaginal infections.

Dosage : Do not use without consulting a physician.

If it is not advised otherwise by a physician: one ovule should be inserted high into the vagina at night and in the morning for 7 days.

In recurrent cases, application of one ovule in the morning and one ovule at night for 14 days is recommended.

Contraindications : Hypersensitivity. Alcohol intake during the therapy & for at least 3 days after the end of the course of treatment. Virgins & young girls who are not sexually mature. Patients using disulfiram during the treatment or within 2 wks. Pregnant women who have trichomonal vaginitis in the 1st trimester. Porphyria, epilepsy, serious liver function disorders. Pregnancy (1st trimester). Lactation: Breastfeeding should be discontinued, but can be started again 24 - 48 hrs after end of treatment.

Precautions : Do not use with other vaginal products (e.g. tampon, douche or spermicide). Not recommended during menstrual period. High doses & long term metronidazole use may cause peripheral neuropathy & convulsion due to systemic usage. Serious impaired renal function requiring hemodialysis, hepatic encephalopathy. Sexual partners of patients with Trichomonas vaginalis should be treated at the same time. Driving or operating machineries. Pregnancy (2nd & 3rd trimesters).

Drug Interactions : Alcohol, amiodarone, oral anticoagulants, phenytoin, phenobarbital, disulfiram, carbamazepine, cimetidine, lithium, fluorouracil, cyclosporine, astemizole, terfenadine. Interference with blood levels of liver enzymes, glucose (hexokinase method), theophylline, & procainamide. Atenocoumarol, anisindione, dicumarol, phenindione, phenprocoumon, warfarin, astemizole, cisapride, terfenadine, carbamazepine, cyclosporine, fentanyl, glimepiride, oxybutynin, oxycodone, phenytoin, fosphenytoin, pimozide, tolterodine, trimetrexate.

Side Effects : Dizziness, headache, vaginal discharge, vaginitis, vulvovaginal irritation, pelvic discomfort.

Storage : Do not store above 25 °C.

Packaging : Carton box contain 10 ovules in two PVC/PE strips.

A medicament is a product which affects your health, and its consumption contrary to instructions is dangerous for you.
Follow strictly the doctors prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medicament.
The doctor and the pharmacist experts in medicine, it's benefits and risks.
Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.
KEEP THE MEDICAMENTS OUT OF REACH OF CHILDREN
Council of Arab Health Ministers& Union of Arab Pharmacists

Reva Pharmaceutical Industry - Syria



بوبيضات مهبلية

ميتروسيبت

تحتوي كل بويضة مهبلية على: ميترونيدازول ٥٠٠ مغ و ميكونازول على شكل نترات ١٥٠ مغ.
الاستطبابات : يوصف ميتروسيبت كعلاج لداء المبيضات البسيض المهبل والتهابات المهبل المسببة بالجراثيم اللاهوائية وفي حالة الإصابة بالمشعرة المهبلية، وكذلك في حالة الالتهابات بأحاج مختلط.

الجرعة : لا يستخدم بويضة مهبلية واحدة بإدخالها عميقاً في المهبل مرتين يومياً صباحاً ومساء لمدة ٧ أيام. يجب ان تستخدم بويضة مهبلية واحدة بإدخالها عميقاً في المهبل مررتين يومياً صباحاً ومساء لمدة ١٤ يوماً.

مضادات الاستطباب : الحساسية، تناول الكحول المتراكم مع تناول الدواء و حتى بعد انتهاء العلاج بفترة ثلاثة أيام، الفتيات غير البالغات جنسياً، المرضى الذين يتغطون باليوسوفيرام بانتظام من تناول الدواء أو خلال أسبوعين، الحوامل المصابات بالمشعرة المهبلية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، الغرفيات، الصدري، القصور الكبدي، الحوامل في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، كما يجب إيقاف الإرضاع أثناء تناول الدواء ثم متتابعة الإرضاع بعد ٤٨ إلى ٢٤ ساعة من انتهاء المعالجة.

الاحتياطات : لا يستخدم هذا الدواء مع التامpon أو الغسولات المهبلية أو قاتلات النطف الموضعي، ولا ينصح باستخدامه أثناء فترة الطمث، الجرعات العالية والاسخدام المديد للميترونيدازول يمكن أن يسبب اعطالات عصبية محبطية أو تشنجات عند استخدامه بالطريق الفموي، كما تجب الحفطة في حالة القصور الكلوي المتطلب للتحال، والاعطالات الكبدية المسببة للقصور الكبدي، كما يجب معالجة الشرك في العملية الجنسية بشكل متزامن في حالة الإصابة بالمشعرة المهبلية، كما تؤخذ الحفطة عندقيادة السيارة أو استخدام الآلات، ويعطى بحذر أيضاً عند الحوامل بعد تجاوز الأشهر الثلاثة الأولى وحتى الولادة.

التداخلات الدوائية : يتداخل هذا الدواء مع كل من: الكحول والأميوارون والسيميتيدين واللثيوم والفالورو بوراسييل والسيكلوكسبورين والأستيميزول والتيرفينادين والثيوفيلين والبروكاتيناميد والأسينوكوماول والأنيسينيديون والديكومارول والفينيتدين والفينبروكومون والوارفارين والسيزابرايد والتيرفينادين والكاربارامازيبين والفينتاكابريل وفينتاكابريل والجليلبيرايد والأوكسيبوتونيں والأوكسيكينات، كما يؤثر على قيم مكونات الدم التالية: أنيزمات الكبد والجلوكوز (طريقة الهكر وكيناز).

التأثيرات الجانبية : الدوار والصداع والمفرزات المهبلية والتهاب المهبل وتهيج المهبل وألم الحوض.

التخزين : يحفظ في مكان جاف بدرجة حرارة لا تزيد على ٢٥°C بعيداً عن الضوء.
التعبئة : عبة كرتونية تحوي ١٠ بويضات مهبلية في شريطين.

الدواء مستحضر يوثر على صحتك واستعماله خالياً للتعليمات عرضك المطر
التي صرفها لك، المأذنون والمصدقون بها المغيران في الدواء ودفعه وضرره.
لآخر صرف الدواء بدون رضاه وصحة طيبة.
لتدرك الآثار غير المتوقعة التي قد تحدث
مجلس وزراء الصحة العرب واتحاد الصيادلة العرب.
اتفاق شركاء ديفقا للصناعات الدوائية - سوريا