

ميتروزول كبسولات - معلق فموي

الكبسولات: تحتوي كل كبسولة على ميترونيدازول ٥٠٠ مغ.
 المعلق الفموي: تحتوي كل ٥ مل من المعلق الفموي على ١٢٥ مغ ميترونيدازول على شكل بنزوات الاستيفاب
 ميترونيدازول له خواص مضادة للأوالي، ويمتلك فعالية ضد المشعرة المهبلية، والمت حول الزهاري،
 والبيارديا المعوية، كما له تأثير مضاد للجراثيم اللاهوائية، حالات أخماق المهيبل اللانوعية،
 وفروحة المسيبة بالجراثيم اللاهوائية، وتقرحات الفراش.

الجرعة وطريقة الاستخدام

التأثيرات الجانبية
 تتضمن التأثيرات الجانبية للميتروزول تأثيرات معدية معوية، غثيان، اللسان المغلف، حفاف الفم،
 طعم غير محبب معدني أوطعم من، الصداع، احمرار أو تحسس الجلد، وبشكل أقل حدوّاً:
 الدوار، الاكتئاب، القلق، الدوخة، آلم إجهازي، بول غامق اللون، وبشكل نادر: ندبة الكرببات
 البيضاء، كما شوهدت اعتلالات عصبية محبطية في المعاجة طويلة الأمد.

الاحتياطات والتحذيرات

ينصح بالمرأة السريرية والمخبرية عند استخدام ميتروزول لمدة تزيد عن ١٠ أيام، كما يجب
 عدم استخدامه عند مرضي اضطراب الصيغة الدموية، وينصح بالحذر عند استخدامه لدى
 مرضي اعتلال الجملة الصبغية المركزية ومرضى اعتلال الكبد (التتشمع)، و عند إعطاء
 ميتروزول المتزامن مع تناول الكحول فإنه يعطي تأثيراً مشابهاً لدليسرفلام.

الحمل والرضاع
 يجب أن لا يعطي ميتروزول للحامل في الأشهر الثلاثة الأولى، كما يجب عدم إعطاؤه للمرضع
 إلا بتوصية الطبيب.

مضادات الاستيفاب
 لا يعطي ميتروزول للمرضى الذين لديهم حالات تحسّس سابقة للميترونيدازول أو أحد مشتقاته.
الذئفين
 يحظى في مكان جاف بدرجة حرارة لا تتجاوز ٢٥°C، بعيداً عن الضوء.

التعينة
 ميتروزول كبسولات: ظرفين من ١٠ كبسولات، كل كبسولة تحتوي على ٥٠٠ مغ
 ميترونيدازول.

ميتروزول معلق فموي: ١٠٠ مل معلق فموي في زجاجة عائمة، تحتوي كل ٥ مل من المعلق
 الفموي على بنزواتات الميترونيدازول بما يعادل ١٢٥ مغ ميترونيدازول.



كبسولات - معلق فموي

الاستيفاب	مدة العلاج	جرعة البالغين	جرعة الأطفال من	جرعة الأطفال من	سنوات	سنوات	سنوات	سنوات
الإسهال	٥ إلى ١٠ أيام	٨٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٣	٧ إلى ١٠	٦	٣ إلى ٧ سنوات
الزهاري	٥ إلى ١٠ أيام	٨٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٣	٧ إلى ١٠	٦	٣ إلى ٧ سنوات
الذاد الاميني	٥ إلى ١٠ أيام	٨٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٣	٧ إلى ١٠	٦	٣ إلى ٧ سنوات
الذاد العرضي	٥ إلى ١٠ أيام	٨٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٣	٧ إلى ١٠	٦	٣ إلى ٧ سنوات
الذاد الاميني	٥ إلى ١٠ أيام	٨٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٣	٧ إلى ١٠	٦	٣ إلى ٧ سنوات
الكتيدي أو خارج	٥ إلى ١٠ أيام	٨٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٣	٧ إلى ١٠	٦	٣ إلى ٧ سنوات
الموري	٣ أيام	٤٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٣	٧ إلى ١٠	٦	٣ إلى ٧ سنوات
داء الحباري	٣ أيام	٤٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٣	٧ إلى ١٠	٦	٣ إلى ٧ سنوات
المشعرة المهبلية	٧ أيام	٢٠٠	١٠٠	١٠٠	٣	٧ إلى ١٠	٦	٣ إلى ٧ سنوات
مخ فنسن	٣ أيام	٢٠٠	١٠٠	١٠٠	٣	٧ إلى ١٠	٦	٣ إلى ٧ سنوات
أخماق	٧ أيام	٤٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٣	٧ إلى ١٠	٦	٣ إلى ٧ سنوات
اللاهوائيات	٧ أيام	٤٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٣	٧ إلى ١٠	٦	٣ إلى ٧ سنوات
أخماق المهيبل	٧ أيام	٤٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٣	٧ إلى ١٠	٦	٣ إلى ٧ سنوات
الأنواعية	٧ أيام	٤٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٣	٧ إلى ١٠	٦	٣ إلى ٧ سنوات
قرحات الأرجل	٧ أيام	٤٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٣	٧ إلى ١٠	٦	٣ إلى ٧ سنوات
وقرحة الفراش	٧ أيام	٤٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٣	٧ إلى ١٠	٦	٣ إلى ٧ سنوات

الدواء مستحضر ي يؤثر على صحتك واستعماله خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.
 اتبع بدقة وصفة الطبيب، وطريقه الاستعمال المخصوص علبهها وتعليمات الصيدلي
 الذي سرقها لك، فأطفيءيب ويسودي ما يخرب في الدواء وينفعه وضرره
 لا يذكر صرف الدواء بدون وصفة طبية.
 مجلس وزراء الصحة العرب واتحاد الصناعات العربية.
 إنتاج شركة ريفا للصناعات الدوائية - سوريا

Metrozol

Capsules / Oral Suspension



Each capsule contains: metronidazole 500 mg

Suspension

Each 5 ml of suspension contains: 125mg metronidazole as benzoate

Metrozol has antiprotozoal action and is effective against *T. vaginalis*, *Entamoeba histolytica*,

Giardia intestinalis and anaerobic bacteria.

Indications: Urogenital trichomoniasis in the female and male, intestinal and extraintestinal amebiasis, Giardiasis, anaerobic bacterial infections, non-specific vaginitis and anaerobically-infected ulcers and pressure sores

Dosage and Administration:

Indications	Durations in days	Adult & Children over 10 years	Children 7-10 years	Children 3-7 years	Children 1-3 years
Amebic dysentery	5-10	800mg tid	400mg tid	200mg qid	200mg tid
Asymptomatic amebiasis	5-10	400-800mg tid	200-400mg tid	100-200mg qid	100-200mg tid
Hepatic & extraintestinal amebiasis	5-10	400-800mg tid	200-400mg tid	100-200mg tid	100-200mg tid
Giardiasis	3	2 g once daily	1 g once daily	600mg once daily	500mg once daily
Trichomoniasis consort treatments recommended	7	200 mg tid	100mg tid	-	-
Vincent's infection	3	200mg tid	100mg tid	100mg tid	50mg tid
Anaerobic infection	7	400mg tid	7.5 mg / kg body weight in divided doses	7.5 mg / kg body weight in divided doses	7.5 mg / kg body weight in divided doses
Non-specific vaginitis	7	400mg tid	7.5 mg / kg body weight in divided doses	7.5 mg / kg body weight in divided doses	7.5 mg / kg body weight in divided doses
Leg ulcer and pressure sore	7	400mg tid	7.5 mg / kg body weight in divided doses	7.5 mg / kg body weight in divided doses	7.5 mg / kg body weight in divided doses

Side Effects: Side effects of Metronidazole include gastrointestinal discomfort, nausea, coated tongue, dryness of mouth and unpleasant metallic or bitter taste, headache, pruritis and skin rashes and less frequently, vertigo, depression, insomnia, drowsiness, urethral discomfort, and darkening of the urine. Occasionally there may be temporary moderate leukopenia. Peripheral neuropathy has been reported in patients on prolonged therapy.

Warning & Precautions: Regular clinical and laboratory monitoring are advised if administration of Metrozol for more than 10 days is considered. It should not be used in patients with blood dyscrasias. Caution is advised in patients with active disease of the central nervous system other than brain abscess and in patients with hepatic encephalopathy. When given in conjunction with alcohol, Metronidazole may provoke a disulfiram like effect.

Use in Pregnancy & Lactation: Metrozol should not be given in the first three months of pregnancy. It should be given during lactation only when the physicians consider it essential.

Contraindication: This is contraindicated in patients with prior history of hypersensitivity to Metronidazole or other Nitroimidazole derivatives.

Storage

Store in a dry place at a temperature not exceeding 25° C and protect from light.

Packaging :

Metrozol 500 Capsules: 2 blister strips of 10 Capsules, each Capsules contains 20 mg Metronidazole.

Metrozol Suspension: 100 ml suspension in amber glass bottle, each 5 ml contains Metronidazole Benzoate equivalent to 125 mg Metronidazole.

-A medicament is a product which affects your health, and its consumption contrary to instructions is dangerous for you.
- Follow strictly the doctors prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medicament.
-The doctor and the pharmacist experts in medicine, its benefits and risks.
-Do not give the same medicament without consulting your doctor.
KEEP THE MEDICAMENTS OUT OF REACH of CHILDREN
Council of Arab Health Ministers& Union of Arab Pharmacists

Reva Pharmaceutical Industry - Syria