

NEW COLD RELIEF



Composition:

New Cold relief Syrup:

Each 5 ml of **New Cold relief** Syrup contains:

Chlorpheniramine (maleate) 2.5 mg - Phenylephrine (HCl) 5 mg

New Cold relief SR-Capsule:

Each SR-Capsule **New Cold relief** contains:

Chlorpheniramine maleate 8 mg - Phenylephrine HCl 20 mg

Properties:

New Cold relief combines the anti-histaminic effect of chlorpheniramine maleate and the decongestant effect of Phenylephrine.

Indications:

New Cold relief is used as a temporarily relief from: runny nose, itchy nose or throat, sneezing, nasal and sinus congestion as may occur with a cold.

Contraindications:

New Cold relief is contraindicated in the following conditions: heart disease, high blood pressure, thyroid disease, diabetes, glaucoma, a breathing problem such as asthma or chronic bronchitis .

Drug Interactions:

Sedatives and tranquilizers: this drug may increase drowsiness when used with sedatives and tranquilizers.

MAO Inhibitors: this drug may potentiate the effect of MAO inhibitors.

Side Effects:

May cause nervousness , dizziness or sleeplessness disorder.

Pregnancy and Lactation:

It is preferred not to use this product during Pregnancy and lactation.

Dosage and Administration:

Children less than 6 years of age: do not use.

Children 6 to under 12 years of age (5 mL) every 8 hours.

Children older than 12 years and adults One SR-Capsule every 12 hours.

STORAGE:

Keep tightly closed, below 25° C, protect from light.

Keep all medicines out of the reach of children.

Packaging:

New Cold relief (Syrup): Bottle of 100 ml.

New Cold relief (SR-Capsule): 10 SR-Capsule package.

-A medication is a product which affects your health, and it's consumption contrary to instructions is dangerous for you.
- Follow strictly the doctors prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medication.
-The doctor and the pharmacist experts in medicine, it's benefits and risks.
-Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.
KEEP THE MEDICAMENTS OUT OF REACH OF CHILDREN
Council of Arab Health Ministers & Union of Arab Pharmacists

Reva Pharmaceutical Industry - Syria



نيوكولد ريليف

التركيب:

نيوكولد ريليف شراب:

كل ٥ مل من شراب نيوكولد ريليف تحتوي:

كلورفينرامين (ماليات) ٢.٥ ملغ - فينيل إيفرين (هيدروكلورايد) ٥ ملغ

نيوكولد ريليف كبسول تحرر مديد:

كل كبسولة نيوكولد ريليف تحرر مديد تحوي:

كلورفينرامين ماليات ٨ ملغ - فينيل إيفرين هيدروكلورايد ٢٠ ملغ

الخواص:

يجمع نيوكولد ريليف بين خواص كلورفينرامين المضادة للهستامين، وخواص فينيل إيفرين المضادة للاحتقان.

الاستجابات:

يغطي نيوكولد ريليف لمعالجة أعراض الرشح من: سيلان الأنف، حكة الأنف والبلعوم، العطاس، احتقان الأنف والجيوب الأنفية.

مضادات الاستطباب:

لا يوصف نيوكولد ريليف في الحالات التالية: الأمراض القلبية، ارتفاع الضغط الشرياني، أمراض الغدة الدرقية، الداء السكري، الغلوكوما، الأمراض التنفسية كالربو والتهاب القصبات الهوائية المزمن.

التداخلات الدوائية:

المهدئات والمطمئنات: الاستخدام المترافق لنيوكولد ريليف مع المهدئات والمطمئنات يزيد من الشعور بالنعاس.

مثبطات خميرة المونو أمينو أو أكسيداز: يزيد استخدام نيوكولد ريليف الأثر المركب لمثبطات خميرة المونو أمينو أو أكسيداز MAO .

الأثار الجانبية:

قد يسبب استخدام نيوكولد ريليف ، العصبية أو الدوار أو اضطرابات في نظام النوم.

الحمل والإرضاع:

يفضل عدم استخدام نيوكولد ريليف أثناء فترة الحمل أو الإرضاع.

الجرعة والاستعمال:

لا يعطى للأطفال تحت ٦ سنوات.

الأطفال من ٦-١٢ سنة: ٥ مل كل ٨ ساعات.

الأطفال فوق ١٢ سنة والبالغون: كبسولة كل ١٢ ساعة.

شروط الحفظ:

يحفظ محكم الإغلاق، دون ٢٥ م، بعيداً عن الضوء.

تحفظ جميع الأدوية بعيداً عن متناول الأطفال.

التعبئة:

نيوكولد ريليف شراب: زجاجة تحوي ١٠٠ مل شراب.

نيوكولد ريليف كبسول مديد التحرر: عبوة تحوي ١٠ كبسولات.

الدواء مستحضر يؤخذ على صحتك واستعماله خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر
اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المخصوص عليها وتعليمات الصيدلي
الذي صرفها لك ، فالتجريب والصيدلي هما المسؤولان في الدواء وبنفعه وضربه .
لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية .
لا تتوكل الأدوية بتناول أيي الأطفال
مجلس وزراء الصحة العرب واتحاد الصيدلة العرب .

إنتاج شركة ريفنا للصناعات الدوائية - سوريا