

# NEW PECT M **Mucolytic**

S.R. Capsules - Syrup - Tablets



## Composition:

Each 1 Tablet contains: Ambroxol HCl 30 mg.

Each 1 SR capsule contains: Ambroxol HCl 75 mg.

Each 5 ml syrup contains: Ambroxol HCl 30 mg.

**Properties:** preclinically, Ambroxol, the active ingredient of New Pect Mucolytic, has been shown to increase respiratory tract secretion. It enhances pulmonary surfactant production and stimulates clinically activity.

These actions result in improved mucus flow and transport (mucociliary clearance).

Improvement of mucociliary clearance has been shown in clinical pharmacological studies. Enhancement of fluid secretion and mucociliary clearance facilitates expectoration and ease cough.

## Indications:

Secretolytic therapy in acute and chronic bronchopulmonary diseases associated with abnormal mucus secretion and impaired mucus transport

## Contraindications:

New Pect Mucolytic should not be used in patients known to be hypersensitive to Ambroxol or other components of the formulation, It should also be used with caution if there is a gastric ulcer.

**Side Effects:** New Pect Mucolytic is generally well tolerated. Mild upper gastro-intestinal side effects (primarily bloating, dyspepsia, and occasionally nausea, vomiting) have been reported, principally following parenteral administration.

Allergic reaction has occurred rarely, primarily skin rashes. There have been extremely rare case reports of severe acute anaphylactic-type reactions but their relationship to New Pect Mucolytic is uncertain. Some of these patients have also shown allergic reaction to other substances.

## Pregnancy and Lactation:

It is recommended not to use during pregnancy. Consult your doctor if you are breastfeeding.

**Drug Interactions:** Administration of New Pect Mucolytic together with

antibiotics (Amoxicilline, Cefuroxime, Erythromycine, Doxycycline) leads to higher antibiotic concentration in the lung tissue. No clinically relevant unfavorable interactions with other medications have been reported.

## Dosage and Administration:

Tablets 30 mg

Adult: 1 tablet 3 times daily

The therapeutic effect may be enhanced by administering 2 tablets 2 times daily.

The tablets should be taken after meals with liquid

Capsules 75 mg SR

Adults: 1 capsule once daily, in the morning or evening after a meal.

The capsule should not be opened or chewed, but swallowed whole with ample liquid.

Syrup

Adults and children over 12 years:

5 ml – 10 ml (1 – 2 tsp.) 3 times daily

For the therapy of acute respiratory tract disorders for the initial treatment of chronic conditions up to 14 days, the dose may be increased to 20 ml ( 2 tablepoons ) 2 times daily.

For the treatment of children under the age of 12 the following dosage regimen is recommended depending on the severity of the disease:

Syrup 30 mg/5 ml

Children 6 – 12 years: 5ml (1 tsp.) 2 – 3 times daily

Children 2 – 6 years: 2.5ml (1/2 tsp.) 3 times daily

Children under 2 years: 2.5ml (1/2 tsp.) 2 times daily

New Pect Mucolytic Syrup should be taken at mealtimes.

**Storage Conditions :** Store in dry place below 25°C

## Packing:

New Pect Mucolytic (Tablet): 20 tablets in box.

New Pect Mucolytic (Capsules): (10 – 20) capsules in a box.

New Pect Mucolytic (Syrup): Bottle of 100 ml.

-A medication is a product which affects your health, and its consumption contrary to instructions is dangerous for you.  
-Follow strictly the doctor's prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medication.  
-The doctor and the pharmacist experts in medicine, its benefits and risks.  
-Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.  
**KEEP THE MEDICATIONS OUT OF REACH OF CHILDREN**  
Council of Arab Health Ministers & Union of Arab Pharmacists

Reva Pharmaceutical Industry - Syria



## نيو بكت م

أقراص - كبسول مديد - شراب

### حال للقسع

#### التركيب:

كل قرص نيو بكت حال للقسع يحتوي: ٣٠ ملغ أمبروكسول هيدروكلورايد  
كل كبسولة نيو بكت حال للقسع يحتوي: ٧٥ ملغ أمبروكسول هيدروكلورايد  
كل ٥ ملغ نيو بكت حال للقسع يحتوي: ٣٠ ملغ أمبروكسول هيدروكلورايد  
**الخواص:** في الدراسات قبل الاكلينيكية تبين أن أمبروكسول، المادة  
الفعالة من نيو بكت حال للقسع تزيد إفراز السبيل التنفسي، مما يحفز إنتاج  
العوامل الفعالة على السطح الرئوية ويبنه النشاط الهديبي وهذه الآثار تؤدي  
إلى تحسين تدفق ونقل المخاط (التصفية المخاطية الهديبية).  
وقد تبين تحسين إفراز السائل والتصفية المخاطية الهديبية إلى طرد البلغم  
وتخفيف السعال.  
**الاستطبابات:**

تحريك واذابة الإفرازات في حال اضطرابات الجهاز التنفسي الحادة  
والمزمنة المصحوبة بزيادة الإفرازات الشعبية وصعوبة نقل المخاط  
**مضادات الاستطباب:**

لا يستعمل مستحضر نيو بكت حال للقسع لدى المرضى الذين لديهم فرط  
الحساسيه للامبروكسول أو لأي من مكونات المستحضر، كما يجب أن  
يستخدم بحذر في حال وجود قرحة معدية .

**الآثار الجانبية:** القدرة على تحمل نيو بكت حاله القسع جيدة بصوره عامة.  
وردت تقارير عن آثار معدية- معوية علوية بسيطة  
(التهاب بالمعدة و عسر الهضم، غثيان وفيء عرضي) خاصه بعد الإعطاء  
الوريدي ونادراً ما تحدث ردود فعل تحسسية و غالباً ما تكون على هيئة  
طفح جلدي و في حالات نادرة جداً ظهرت تفاعلات استهدافية حادة شديدة و  
لم تثبت علاقتها باستعمال نيو بكت حال القسع وقد ظهرت عند بعض هؤلاء  
المرضى تفاعلات تحسسية لمواد أخرى.

**الحمل والإرضاع:** ينصح بعدم استعماله خلال الحمل، يجب استشارة  
الطبيب في حال الرضاعة.

#### التداخلات الدوائية:

عند إعطاء نيو بكت حال للقسع مع المضادات الحيوية (أموكسيسيلين،

سيفوروكسيم، أريثرومايسين، دوكسيسيكلين) فإنه يؤدي إلى زيادة تركيز  
المضاد الحيوي في النسيج الرئوي، كما أنه لم ترد تقارير عن أية تفاعلات  
سلبية ذات دلالة سريرية بالارتباط مع سائر الأدوية.  
**الجرعة والاستخدام:**

#### الأقراص:

البالغون: قرص واحد ٣ مرات يومياً  
يمكن زيادة التأثير العلاجي بإعطاء قرصين مرتين يومياً. يجب أن تؤخذ  
الأقراص بعد الوجبات مع أحد السوائل.  
الكبسول المديد:  
البالغون: كبسولة واحدة مديدة مرة يومياً  
يجب عدم فتح أو مضغ الكبسولات ويجب بلعها كاملة مع قيل من السوائل.  
الشراب:

البالغون والأطفال فوق ١٢ سنة: معلقة أو معلقين ٣ مرات يومياً لعلاج  
الاضطرابات الحادة بالسبيل التنفسي وللعلاج الابتدائي للحالات المزمنة  
حتى ١٤ يوماً يمكن زيادة الجرعة إلى ٢٠ مل (٢ معلقة كبيرة) مرتين  
يوماً

الأطفال أقل من ١٢ سنة: يوصى باتتباع نظام الجرعة التالية وفقاً لشدة  
المرض

الأطفال ٦ - ١٢ سنة: ٥ ملغ (معلقة صغيرة) ٢ - ٣ مرات يومياً  
الأطفال ٢ - ٦ سنة: ٢,٥ مل (نصف معلقة صغيرة) ٣ مرات يومياً.  
الأطفال أقل من سنتين: ٢,٥ مل (نصف معلقة صغيرة) مرتين يومياً.  
يجب أن تؤخذ جرعة نيو بكت حال للقسع أثناء تناول الطعام.  
**شروط الحفظ:** يحفظ في مكان جاف دون ٢٥°م.

#### التعبئة:

الأقراص عيار ٣٠ ملغ: عبوة تحتوي ٢٠ قرص  
كبسول عيار ٧٥ مديد: عبوة تحتوي (١٠ - ٢٠) كبسولة.  
الشراب: عبوة زجاجية ١٠٠ مل

الدواء مستحضر يؤخذ على صحتك واستعماله خلافاً للتعليمات بعرضك للخطر  
اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المصنوع من عليها وتعليمات الصيدلي  
الذي صرفها لك، فالطبيب والصيدلي هما الخيران في الدواء وينقعه وضرره.  
لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية.  
لا تتركه الأوعية بمقتول أيدي الأطفال.  
محسب وزراء الصحة العرب واتحاد الصيدلانة العرب.

إنتاج شركة ريفأ للصناعات الدوائية - سوريا