

# NEW PECT D.C

Syrup  
DRY COUGH



## COMPOSITION:

Each 5 ml of NEW PECT DRY COUGH syrup contains:

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Dextromethorphan (HBr) | 10 mg. |
| Oxememazine (HCl )     | 1.5mg. |
| Sodium benzoate        | 60mg.  |

## PROPERTIES:

NEW PECT DRY COUGH combines the central antitussive effect of dextromethorphan that remains 4 to 5 hours, with the antihistaminic effect of oxememazine, in addition to the kindly expectorant effect of sodium benzoate.

## INDICATIONS:

NEW PECT DRY COUGH is indicated in the treatment of dry and allergic cough.

## DOSAGE:

NEW PECT DRY COUGH is well-tolerated in adults and children.

Adult: (1- 2) teaspoonfuls (3 -4) times daily.

Children (1 - 6) years: (0.25- 0.5) teaspoonfuls (3- 4) times daily.

Children (6- 12) years: (0.5- 1) teaspoonfuls (3- 4) times daily.

## CONTRAINDICATIONS:

- Hypersensitivity to any of its components.
- It should not be used in pregnancy and lactation.

## SIDE EFFECTS:

The adverse effects include: drowsiness, dizziness,

gastrointestinal disturbances, xerostomia, and ischuria.

## DRUG INTERACTIONS:

It promotes the effect of the antimuscarinic agents (Atropine) and MAOI and Tricyclic antidepressants. It increases the hypnotic effect of CNS Inhibitors.

## PRECAUTIONS:

Machine operators must be careful because it may cause drowsiness.

## WARNINGS:

- Caution should be taken in patients with asthma, and this medicine should not be taken during the acute attack
- This medicine should not be taken in patients with respiratory depression.
- You should not drive cars during the administration of this medicine because of the sleepiness effect of it.
- It should be used with caution in patients with narrow-angle glaucoma, ischuria, prostate macrogenesis, hepatic insufficiency, and epilepsy

## STORAGE:

Keep tightly closed, below 25°C, protect from light.

Keep all medicines out of the reach of children.

## PACKAGE:

NEW PECT DRY COUGH: Bottle contains 100 ml syrup

-A medicament is a product which affects your health, and it's consumption contrary to instructions is dangerous for you.  
- Follow strictly the doctor's prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medicament.  
-The doctor and the pharmacist experts in medicine, it's benefits and risks.  
-Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.  
**KEEP THE MEDICAMENTS OUT OF REACH OF CHILDREN**  
Council of Arab Health Ministers & Union of Arab Pharmacists

Reva Pharmaceutical Industry - Syria



ريفا فارما

## نيو بكت د.سي للسعال الجاف

شراب

### الآثار الجانبية:

تتضمن التأثيرات الجانبية: نعاس، دوخة، اضطرابات معدية معوية، جفاف فم، احتباس بولي.

### التداخلات الدوائية:

يعزز تأثير مضادات المسكارين (الأثروبين) ومضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات ومثبطات أكسيداز أحادي الأمين يزيد من التأثير المنوم لمثبطات الجملة العصبية المركزية.

### الاحتياطات:

يمكن أن يسبب النعاس عند بعض الأشخاص لذلك يجب الحذر عند مستخدمي الآلات.

### التحذيرات:

- يجب أخذ الحذر عند مرضى الربو ويجب ألا يؤخذ هذا الدواء أثناء الهجمة الحادة.

- يجب عدم قيادة السيارة أثناء تناول الدواء بسبب تأثيره المحدث للنعاس

- يجب عدم استعمال الدواء عند مرضى القصور التنفسي.

- يؤخذ بحذر في مرضى الزرق ضيق الزاوية، الاحتباس البولي، تضخم البروستات، في القصور الكبدي والصرع

### الحفظ:

يحفظ محكم الاغلاق، دون ٢٥°م، بعيداً عن الضوء.

تحفظ جميع الأدوية بعيداً عن متناول الأطفال.

### التعبئة:

نيو بكت للسعال الجاف: زجاجة تحوي ١٠٠ مل شراب

الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستعمله خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر  
اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المخصوص عليها وتعليمات الصيدلي  
الذي صرفها لك ، فاطبيب و الصيدلي هما الخبيران في الدواء وينقعه وضروه  
لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية  
لا تترك الأدوية بمتناول أيدي الأطفال  
مجلس وزراء الصحة العرب واتحاد الصيدالة العرب

إنتاج شركة ريفا للصناعات الدوائية - سوريا

### التركيب :

تحتوي كل ٥ مل نيو بكت للسعال الجاف شراب على:

ديكستروميثورفان (هيدروبرميد) ١٠ ملغ.

أوكسوميمازين (هيدروكلوريد) ١,٥ ملغ.

بنزوات الصوديوم ٦٠ ملغ.

### الخواص:

يجمع نيو بكت للسعال الجاف بين التأثير المركزي للديكستروميثورفان المضاد للسعال الذي يستمر من (٤-٥) ساعات، والأوكسوميمازين المضاد للهيستامين، بالإضافة إلى التأثير المقشع اللطيف لبنزوات الصوديوم.

### الاستطبابات:

يستطب نيو بكت للسعال الجاف في معالجة السعال الجاف التحسسي.

### الجرعة:

نيو بكت للسعال الجاف جيد للتحمل عند البالغين والأطفال.

- البالغين: (١-٢) معلقة صغيرة (٣-٤) مرات يومياً.

- الأطفال (١-٦) سنوات : (٢٥ - ٠,٥) معلقة صغيرة (٣-٤) مرات يومياً.

- الأطفال (٦-١٢) سنة: (٠,٥ - ١) معلقة صغيرة (٣-٤) مرات يومياً.

### مضادات الاستطباب:

- فرط التحسس لأي من مركباته.

- لا يستعمل في حالة الحمل والإرضاع.