

# REVAGRIP Capsule



Reva Pharma

## Composition

Each capsule contains: Paracetamol 500mg, Guaiifenesin 100mg, phenylephrine hydrochloride 6.1mg.

## Pharmacologic Properties

Analgesic - Antipyretic

Expectorant

Nasal decongestant

## Indications

For the relief of symptoms associated with colds and flu and the pain and congestion of sinusitis, including aches and pains, headache, blocked nose and sore throat, chills, lowering of temperature, and to loosen stubborn mucus and provide relief from chesty coughs.

## Contraindications

- Known hypersensitivity to any of the ingredients.
- Concomitant use of other sympathomimetic decongestants.
- Phaeochromocytoma.
- Closed angle glaucoma.
- Hepatic or severe renal impairment, hypertension, hyperthyroidism, diabetes, heart disease or those taking tricyclic antidepressants or beta-blocking drugs and those patients who are taking or have taken within the last two weeks, monoamine oxidase inhibitors

## Warnings and Precautions

- Patients suffering from chronic cough or asthma should consult a physician before taking this product.
- Do not take with a cough suppressant.  
Medical advice should be sought before taking this product in patients with these conditions:
- An enlargement of the prostate gland
- Occlusive vascular disease (e.g. Raynaud's Phenomenon)
- This product should not be used by patients taking other sympathomimetics (such as decongestants, appetite suppressants)
- Concomitant use of other paracetamol-containing products should be avoided.

## Drug Interactions

### Paracetamol

The anticoagulant effect of warfarin and other coumarins may be enhanced by prolonged regular use of paracetamol with increased risk of bleeding. The hepatotoxicity of paracetamol may be potentiated by excessive intake of alcohol. The speed of absorption of paracetamol may be increased by metoclopramide or domperidone and absorption reduced by colestyramine.

**Phenylephrine:** should be used with caution in combination with the following drugs as interactions have been reported:

Monoamine oxidase inhibitors

Sympathomimetic amines

Beta-blockers and other antihypertensives

Tricyclic antidepressants

Ergot alkaloids

Digoxin and cardia glycosides

**Guaiifenesin:** No significant interactions with other drugs have been noted.

## Pregnancy and lactation

### Pregnancy

This product should not be used during pregnancy without medical advice.

Human and animal studies with paracetamol have not identified any risk to pregnancy or embryo-foetal development.

No relevant data are available for products containing phenylephrine.

The safety of guaiifenesin during pregnancy has not been established.

### Lactation

This product should not be used whilst breast feeding without medical advice.

Human studies with paracetamol have not identified any risk to lactation or the breast-fed offspring.

Paracetamol crosses the placental barrier and is excreted in breast milk. Phenylephrine may be excreted in breast milk.

No relevant data available for guaiifenesin.

## Dosage and Administration

*Adults, the elderly and children aged 16 years and over:*

Two capsules every four hours as required. Do not take more than 8 capsules (4 doses) in any 24 hour period.

Not to be given to children under 16 years except on medical advice.

Do not take continuously for more than 5 days without medical advice.

## Side Effects

- Allergic reactions: such as skin rash and itching sometimes with swelling of the mouth or face.
- Reoccurring fevers or infections.
- Nausea, sudden weight loss, loss of appetite and yellowing of the eyes and skin.
- Visual disturbances. This is rare but is more likely in those with glaucoma.
- Unusually fast pulse rate or sensation of an unusually fast or irregular heartbeat.
- Difficulty passing water. This is more likely to occur in men with an enlarged prostate gland.

## Storage

Do not store above 25°C.

## Packaging

Carton package with tow blisters, every blister contains 10 capsules.

-A medicament is a product which affects your health, and it's consumption contrary to instructions is dangerous for you.

-Follow strictly the doctors prescription, the dose, the time and the instructions of the product when the medicament is used.

-The doctor and the pharmacist experts in medicine, it's benefits and risks.

-Do not repeat same medicament without doctor's permission.

KEEP THE MEDICAMENTS OUT OF REACH OF CHILDREN.

Council of Arab Health Ministers& Union of Arab Pharmacists

Reva Pharmaceutical Industry - Syria



# رِفَاكَرِيبْ كِبُول

التركيز

- فوليدات الارغوت  
الديجوكسين والغلوكوريدات الكلبية  
غوايفينزين:  
لم يلاحظ أي تداخلات مع أدوية أخرى.  
**الحمل والرضاعة**  
الحمل  
يجب عدم استخدام هذا المنتج أثناء الحمل دون استشارة طبية.  
الدراسات السريرية والحوادث على الباراسيتامول لم توصل لأي خطر على الحمل أو نمو الجنين.  
لا توجد بيانات متاحة للمنتجات التي تحتوي على فينيل فرين.  
سلامة غوايفينزين خلال فترة الحمل لم تثبت.
- الرضاعة  
لا ينبغي استخدام هذا المنتج أثناء الرضاعة الطبيعية دون استشارة طبية.  
لم تحدد الدراسات التي أجريت على البشر الباراسيتامول أي خطر على المرضع أو الرضيع.  
يعبر الباراسيتامول حاجز المشيمة ويفرز في حليب الثدي. قد يفرز الفينيل فرين في حليب الثدي.  
لا توجد بيانات ذات صلة متاحة لـ غوايفينزين.
- الجرعة وطريقة الاستعمال**  
البالغين والمصريين والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ٦ سنة وما فوق:  
كبسولات كل أربع ساعات حسب الحاجة. لا تأخذ أكثر من ٨ كبسولات (٤ جرعات) خلال ٢٤ ساعة.  
لا يعطى للأطفال دون سن ٦ سنة دون استشارة طبية.  
لا تأخذ المستحضر باستمرار لأكثر من ٥ أيام دون استشارة طبية.  
**الأثار الجانبية**  
المحسنة: مثل الطفح الجلدي والحكمة، أحياناً مع تورم في الفم أو الوجه.  
متكرر الحمى أو الالهابات.  
«الغثيان وفقدان الوزن المفاجئ وفقدان الشهية واصفرار العينين والجلد»  
اضطرابات قصبية. هذا نادر ولكنه أكثر انتشاراً في أولئك الذين يعانون من الزرق.  
تضخم البنكرياس على نحو غير عادي أو احتقان بشرس نبضات القلب بصورة غير عادية أو ضربات قلب غير منتظمة.  
مفعوية في التبول. هذا أكثر احتمالاً أن يحدث في الرجال الذين يعانون من تضخم غدة البروستات.  
التخزين: لا تخزن الدواء بدرجة حرارة أعلى من ٢٥ درجة مئوية.  
التعبئة: عبوة كرتونية تحوي 2 بليستر، كل بليستر يحتوي ١٠ كبسولات.

كل كبسولة تحتوي على: باراسيتامول ٥٠٠ ملجم، غوايفينزين ١٠٠ ملجم، فينيل فرين هيدروكلوريد ٥٠ ملجم.

## الخصائص الدوائية :

- مسكن للألم واحفظ الحرارة

## مفعى

## مصداد احتقان أنفي

## الاستabilات

التخفيف من الأعراض المصاحبة للرشح والأنفلونزا والألم واحتقان الجيوب الأنفية، بما في ذلك الصداع، والألم المسدود والتياх البليع، والتشعيرية، وخصوص درجة الحرارة، وتخفيف لزوجة المخاط وتحفيظ السعال الصدرى.

## مصدادات الاستabilات

مفرط حساسية معروفة لأي من المكونات المستحضر.

استخدام متزامن للمصدادات الاحتقان الأخرى الودية.

## دوره الواقت

مطرد كبيدي أو طوي شديد، وارتفاع ضغط الدم ، وفرط شاطئ الغدة الدرقية ، والداء السكري ، وأمراض القلب، المرض الذي يتناولون مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات أو حاسرات البتا، وأولئك المرضى الذين يتناولون أو أخذوا خلال الأشهر عين الأخيرون، مثبطات موتو أوكسيداز.

## التذبذبات والاختيارات

يجعل على المرضى الذين يعانون من السعال المزمن أو الربو استشارة الطبيب قبل أخذ هذا المنتج.  
لا تأخذ المصنورة الطبية قبل أخذ هذا المنتج لدى المرضى الذين يعانون من هذه الحالات.  
يجب طلب المثورة الطبية قبل أخذ هذا المنتج لدى المرضى الذين يعانون من هذه الحالات.

## تضخم غدة البروستات

لا ينبغي أن يستخدم هذا المنتج قبل المرضى الذين يتناولون محاكبات الودي الأخرى (مثل مزيارات الودي، ومتثبات الشهية)

ينبغي تجنب استخدام الدواء مع المنتجات الأخرى المحتوية على الباراسيتامول.

## التناولات الودية

يمكن أن يتعزز التأثير المضاد للไวروسات وغيرها من مشتقات الكومارين غير الاستخدام المنتظم المستمر للباراسيتامول مع زيادة بخطير النزف. يمكن تعزيز المسمية الكبدية للباراسيتامول بسبب تناول الكحول بشكل مفرط قد يتم زيادة سرعة امتصاص الباراسيتامول بواسطة متوكلوراميد أو دوميريدون في حين يقل امتصاصه بواسطة كوليستيرين.

## الفينيل فرين:

يجب استخدامه بحذر مع الأدوية التالية حيث تم الإبلاغ عن تداخلات دوائية:

متثبات الموتوكسيداز

## الميدينات المحاكبة الودي

حاصرات بيتا ودوية ضغط الدم الأخرى

مصدادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات

الدارج من تأثير دواف على مسكنات (استهلاك، خلاصات، علاجات) تختلف عن تلك التجارب  
الذين صوّرها، فالطبخ، المختبر، مما يغير في الدارج ونوعه ووزنه.  
الأنزك: صرف الداء بدون وصفة طبية.  
الأنزك الأدوية المترافق لدواء الأدواء.  
مثبط وزوارد المساعدة للقلب والدم والسائلة العرق.  
إنتاج شركة ديماك للمستعاثات الدوائية - سوريا