

REVAGRIP Syrup



Composition

Each 5 ml contains: paracetamol 160mg, chlorpheniramine maleate 1mg, dextromethorphan hydrobromide 5mg, phenylephrine hydrochloride 2.5mg

Pharmacologic Properties

Analgesic - Antipyretic

Antihistamine

Cough suppressant

Nasal decongestant

Indications

- temporarily relieves the following cold/flu symptoms:
 - minor aches and pains
 - cough
 - headache
 - sore throat
 - sneezing and runny nose
 - stuffy nose

- temporarily reduces fever

Warnings and Precautions

Liver warning: This product contains paracetamol. Severe liver damage may occur if your child take:

- more than 5 doses in 24 hours, which is the maximum daily amount
- with other drugs containing paracetamol

Do not use

- to make a child sleepy
- with any other drug containing acetaminophen.
- in a child who is taking a prescription monoamine oxidase inhibitor (MAOI)
- if your child is allergic to paracetamol or any of the inactive ingredients in this product.

Ask a doctor before use if the child has

- liver disease

- glaucoma
- thyroid disease
- diabetes
- heart disease
- high blood pressure
- a breathing problem such as chronic bronchitis
- cough that occurs with too much phlegm (mucus)
- persistent or chronic cough such as occurs with asthma

Ask a doctor or pharmacist before use if the child is taking

- sedatives or tranquilizers
- warfarin

When using this product

- do not exceed recommended dose
- excitability may occur, especially in children
- marked drowsiness may occur
- sedatives and tranquilizers may increase drowsiness

Dosage and Administration

Weight (kg)	Age (yr)	Dose (mL)
22-43	6-11	10 mL
16-21	4-5	do not use unless directed by a doctor
under 16	under 4	do not use

- if needed, repeat dose every 4 hours while symptoms last
- do not give more than 5 doses in any 24-hour period

Storage store between 15 -25°C.

Packaging : Bottle of 100 ml

-A medication is a product which affects your health, and it's consumption contrary to instructions is dangerous for you.
- Follow strictly the doctor's prescription, the method of use and the interactions of the pharmacist who sold the medication.
-The doctor and the pharmacist experts in medicine, its benefits and risks.
-Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.
KEEP THE MEDICAMENTS OUT OF REACH OF CHILDREN.
Council of Arab Health Ministers- Union of Arab Pharmacists

Reva Pharmaceutical Industry - Syria



ريفافارما

ريفافارما

- الزرق
- أمراض الغدة الدرقية
- داء السكري
- أمراض القلب
- ضغط دم مرتفع
- مشكلة في التنفس مثل التهاب القصبات المزمن
- السعال الذي يحدث مع الكثير من البلغم (المخاط)
- السعال المستمر أو المزمن مثل الذي يحدث مع الربو
- المهدئات أو المنومات
- الوارفارين
- عند استخدام هذا المنتج:
- لا تتجاوز الجرعة الموصى بها
- قد تحدث استئثاره ، خاصة عند الأطفال
- قد يحدث نعاس ملحوظ
- المهدئات والمنومات قد تزيد النعاس
- الجرعة والاعطاء

الجرعة (مل)	العمر بالسنوات	الوزن (كغ)
١٠ مل	٦-١١ سنة	٢٢-٤٣ كغ
لا تستخدم قبل استشارة الطبيب	٤-٥ سنة	١٦-٢١ كغ
لا تستخدم	تحت ٤ سنوات	تحت ١٦ كغ

- في حال استمرار الأعراض، يمكن تكرار الجرعة كل ٤ ساعات
- لا تعطي أكثر من ٥ جرعات خلال فترة ٢٤ ساعة
- التخزين : يخزن بدرجة حرارة بين ١٥-٢٥ درجة مئوية
- التعبئة : زجاجة ١٠٠ مل

الدواء مستحضر باءر على صيغته واستعماله دائما لتعليمات بحرصك للخطر
التي يباعها وصفا الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلي
التي صرحتها لك ، فالطب والصيابة هما الجوانب في الدواء وبقائه وضرره
التي لا تعرف صوابا ولا خطأ بدون وصفة طبية .
لائحة الأدوية مسجلة لدى السلطات
مجلس وزراء الصحة العرب واتحاد الصيدلة العرب
إنتاج شركة ريفافارما للصناعات الدوائية - سوريا

- التركيب : كل ٥ مل يحتوي على باراسيتامول ١٦٠ ملغ،
كلورفينيرامين مالتات ١ ملغ - ديكستروميثورفان هيدروبرومايد ٥
ملغ - فينيل إفرين هيدروكلورايد ٢.٥ ملغ
- الخصائص الدوائية
- مسكن للألم وخافض للحرارة
- مضاد هيستامين
- كابت سعال
- مزيل احتقان أنفي
- الاستطبابات
- يزيل أعراض الرشح / الإنفلونزا التالية:
- الأوجاع والآلام الطفيفة
- السعال
- الصداع
- التهاب البلعوم
- العطاس وسيلان الأنف
- انسداد الأنف
- ارتفاع درجة الحرارة
- التحذيرات والاحتياطات
- تحذير الكبد: يحتوي هذا المنتج على باراسيتامول لذلك قد يحدث أذية
حادة في الكبد إذا أخذ طفلك:
- أكثر من ٥ جرعات خلال ٢٤ ساعة ، وهي الحد الأقصى للجرعة
اليومية
- بالمشاركة مع أدوية أخرى تحتوي على باراسيتامول
- لا تستخدم الدواء:
- لجعل الطفل ينام
- مع أي دواء آخر يحتوي على باراسيتامول.
- لدى الطفل الذي يتناول مثبطات مونو أمينوأكسيداز (MAOI)
- إذا كان طفلك يعاني من حساسية تجاه باراسيتامول أو أي من
المكونات الفعالة في هذا المنتج.
- استل الطبيب قبل الاستخدام إذا كان الطفل يعاني من :
- أمراض الكبد