

REVAFURYL

Capsule - Oral Suspension



Composition:

Oral Suspension: Each 5 ml of **REVAFURYL** Oral suspension contains Nifuroxazide 218 mg of equivalent to 200 mg /5gr of suspension.

Capsules: Each **REVAFURYL** capsule contains Nifuroxazide 200 mg.

Pharmacological properties:

Nifuroxazide is an antibacterial belonging to the nitrofuran group. It has an Intestinal antibacterial effect by direct contact with the inner lumen of the intestine, as it is poorly absorbed from the gastrointestinal tract.

Indications:

REVAFURYL is indicated if:

- Acute diarrhea of bacterial origin.
- Inflammatory bowel.
- Acute and chronic colitis.
- As an intestinal disinfectant in all other types of diarrhea and intestinal infections.
- Prevention of infection of the intestine with opportunistic germs.

Contraindications:

- Hypersensitivity to nitrofurans, nifuroxazide, or any of the components of the product.
- Premature infants and newborns under the age of one month.

Warnings & precautions:

- If there is blood or mucus associated with the stool.
- If there is a fever, vomiting, or other associated digestive disturbances.
- You should see a doctor if the diarrhea continues after three days of starting treatment.
- Nifuroxazide can cause acute pancreatitis, so if you see the following symptoms: (nausea, Vomiting accompanied by abdominal pain) Treatment should be stopped immediately and a doctor should be consulted.
- Nifuroxazide does not improve rehydration, so its use must be accompanied by a specific dietary schedule to prevent dehydration and loss of minerals and vitamins, it is recommended to eat rice, bananas, grilled meat and mint tea in the event of diarrhea, and it is preferable to stay away from milk and its derivatives.

Pregnancy & lactations:

Pregnancy: Although studies on experimental animals exclude the distorting effect of fetuses when using nifuroxazide, there are no adequate studies to prove this, it is preferable not to use nifuroxazide during pregnancy without consulting a doctor, and treating diarrhea in pregnant women by modifying the food intake only.

Lactation: A nursing woman can continue breastfeeding her child in the event that her use of nifuroxazide is for a short period (not exceeding three days).

Drug interactions:

- In order to avoid interactions with other medicines, the doctor or pharmacist must be informed of any other treatment the patient takes it.
- This medicine should not be used concomitantly with the use of sedatives (benzodiazepines: Calpromazepam, alprazolam, lorazepam, midazolam, and others).

Side Effects:

Nifuroxazide can cause the following side effects:

- Quincke's edema: This is angioedema of the tissues under the skin and manifesting an allergic reaction.
- Urticaria.
- Anaphylactic shock.

Dosage & Administration:

Children aged 2 years: 5 ml of the suspension 3 times a day, for 3 days.

Adults: one capsule 4 times a day.

- The maximum daily dose of nifuroxazide is 800 mg
- The treatment period should not last more than 7 days.
- It is not recommended for use in children under 2 years of age.
- The use of the medicine is not related to eating (it can be used before or after meals).

Storage:

Store in a dry place at a temperature not exceeding 25° C and protect from light.

Packaging:

Oral suspension: Carton box contains 100 ml opaque bottle.

Capsule: carton box contains 20 capsules in two blister strips.

-A medicament is a product which affects your health, and it's consumption contrary to instructions is dangerous for you.
- Follow strictly the doctors prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medicament.
-The doctor and the pharmacist experts in medicine, it's benefits and risks.
-Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.
KEEP THE MEDICAMENTS OUT OF REACH OF CHILDREN
Council of Arab Health Ministers& Union of Arab Pharmacists



ريفا فارما

ريفا فوريل

كبسول - معلق قموي

التركيب:

المعلق القموي: كل ٥ مل ريفافوريل معلق قموي تحتوي على نيفوروكسازيد ٢١٨ ملغ ما يعادل ٢٠٠ ملغ / ٥ غ من المعلق.

الكبسول: كل كبسولة ريفافوريل تحتوي على نيفوروكسازيد ٢٠٠ ملغ.

الخصائص الدوائية:

نيفوروكسازيد هو مضاد جرثومي ينتمي إلى مجموعة النيتروفوران، يمتلك تأثيراً مضاداً للجراثيم المعوية عن طريق التماس المباشر مع اللعنة الداخلية للأمعاء، كونه ضعيف الامتصاص من السبيل المعدي المعوي.

الاستنباطات:

يُستطب ريفافوريل في حال:

- الإسهال الحاد ذو المنشأ الجرثومي.

- التهاب الأمعاء.

- التهابات القولون الحاد والمزمن.

- كمظهر معوي في كل أنواع الإسهالات الأخرى وأخماج الأمعاء.

- الوقاية من إصابة الأمعاء بالجراثيم الانتهازية.

مضادات الاستطباب:

- فرط الحساسية تجاه النيتروفوران أو النيفوروكسازيد أو أي من مكونات المستحضر.

- الخذج والأطفال حديثي الولادة دون عمر الشهر.

التحذيرات والإحتياطات:

- في حال وجود دم أو مخاط مترافق مع البراز.

- في حال وجود حمى أو إقياءات أو اضطرابات هضمية أخرى مترافقة.

- يجب مراجعة الطبيب في حال استمرار الإسهال بعد ثلاثة أيام من بدء العلاج.

- يمكن أن يسبب النيفوروكسازيد التهاب البنكرياس الحاد، لذلك في حالة مشاهدة الأعراض التالية: (غثيان، إقياء مترافق مع ألم في البطن) يجب فوراً إيقاف المعالجة ومراجعة الطبيب.

- نيفوروكسازيد لا يحسن من الإمهاة، لذلك يجب أن يترافق استخدامه مع جدول غذائي محدد لمنع التجفاف وفقدان المعادن والفيتامينات، ينصح بتناول الأرز والموز واللحوم المشوية والشاي بالنعناع في حالة الإصابة بالإسهال، ويفضل الابتعاد عن الحليب ومشققاته.

الحمل والإرضاع:

الحمل: على الرغم من أن الدراسات على حيوانات التجربة تستبعد التأثير المشوه للأجنة عند استعمال النيفوروكسازيد إلا أنه لا يوجد دراسات كافية لإثبات ذلك، يفضل عدم استخدام نيفوروكسازيد خلال الحمل دون استشارة الطبيب، وعلاج الإسهال لدى الحامل

من خلال تعديل الوارد الغذائي فقط.
الإرضاع: يمكن للمرضع متابعة إرضاع طفلها في حال كون استخدامها لـ نيفوروكسازيد لمدة قصيرة (لاتتجاوز ثلاثة أيام).

التداخلات الدوائية:

- من أجل تجنب التداخلات مع أدوية أخرى، يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي عن أي علاج آخر يتناوله المريض.

- يجب عدم استخدام هذا الدواء بشكل مترافق مع استخدام المهدئات (البنزوديازيبينات: كالبرومازيبام والبرازولام ولورازيبام وميدازولام وغيرها).

التأثيرات الجانبية:

يمكن أن يسبب نيفوروكسازيد التأثيرات الجانبية التالية

- وذمة كرينك: وهي وذمة وعائية تصيب الأنسجة تحت الجلد وتظهر بتفاعل تحسسي.

- الشرى.

- الصدمة التأقية.

الجرعة والإستعمال:

الأطفال فوق ٢ سنة: ٥ مل من المعلق ٣ مرات في اليوم لمدة ثلاثة أيام.

البالغين: كبسولة واحدة ٤ مرات في اليوم.

- الحد الأقصى للجرعة اليومية من نيفوروكسازيد هي ٨٠٠ ملغ

- يجب أن لا تتوهم فترة المعالجة أكثر من ٧ أيام.

- لا يُنصح باستخدامه عند الأطفال بعمر أقل من سنتين.

- لا علاقة لاستخدام الدواء بتناول الطعام (يمكن استخدامه قبل أو بعد الوجبات).

شروط الحفظ:

يُحفظ في مكان جاف بدرجة حرارة لاتتجاوز ٢٥ م°، بعيداً عن الضوء.

التعبئة:

المعلق القموي: عبوة كرتونية تحتوي على زجاجة عاتمة سعة ١٠٠ مل.

الكبسول: عبوة كرتونية تحتوي على ٢٠ كبسولة ضمن شريطين بليستر.

الدواء مستحضر يؤخذ على صحتك واستعماله خالفاً للتعليمات بعرضك للخطر
اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المصنوع من عليها وتعليمات الصيدلي
التي صرفها لك ، فالطبيب والصيدلي هما الخبيران في الدواء وينقعه وضروبه.
لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية.
لا تترك الدواء بمقتال أيدي الأطفال.
محيط بوزراء الصحة العرب واتحاد الصيدلة العرب.

إنتاج شركة ريفا للصناعات الدوائية - سوريا