

Composition:

Each VIRTA Capsule contains: Epimedium extract 300 mg.

Mechanism of Action:

VIRTA helps increase blood flow and improve sexual function by three different mechanisms include: Increased testosterone and nitric oxide levels, which is essential for arousal and the occurrence of an erection, it also causes elevated levels of the main cholinergic neurotransmitters associated with sexual arousal in man and woman.

Research has shown that VIRTA has anti-fatigue effects, which can only be helpful during sexual activity. It also contains phytoestrogens, that can reduce osteoarthritis in postmenopausal women.

Indications:

VIRTA uses for treatment:

- Sexual disorder (decreased libido).
- Sexual disorder by prostate function disorder.
- Decline of sexual feeling for men and women.

Contraindications:

Hypersensitivity to active substance or to any of excipient.

Warnings & Precautions:

- Bleeding disorders: VIRTA might slow blood clotting. This might increase the risk of bleeding. Stop VIRTA at least 2 weeks before surgery.
- VIRTA acts like estrogen and can increase estrogen levels in some women.
- In people with low blood pressure, use of VIRTA may cause blood pressure to very low and increase the risk of fainting.

Pregnancy & Lactation:

Pregnancy: VIRTA should not be used in the pregnancy.

Lactation: Breast-feeding is not recommended to women taking VIRTA.

Driving & Using Machines:

VIRTA has no effects on the ability to drive and use machines.

Drug Interactions:

- Concomitant use of VIRTA with antihypertensive medications may cause very low blood pressure
- Taking VIRTA with Anticoagulant / Antiplatelet drugs might increase the chances of bruising and bleeding.

Side Effects:

Using VIRTA according to the prescribed dosage is safe and has no side effects. But when used in high doses and for long periods might cause dizziness, vomiting, dry mouth, thirst, and nose bleed.

Dosage & Administration:

For men: The recommended dose is 1-2 capsules 90 minutes before sexual intercourse, the dose can be increased to 3 capsules if needed.

For women: 1 Capsule 30 min before sexual intercourse.

Storage:

Keep out of reach of children. Store below 30 °C.

Packaging:

Each VIRTA carton box contains: 4 Capsules in a blister strip.

Each VIRTA carton box contains: 10 Capsules in a blister strip.



فيرتا كبسول

التكوين:

كل كبسولة فيرتا تحتوي على: خلاصة الإبيميديوم ٣٠٠ ملغ.

آلية التأثير:

يساعد فيرتا على زيادة تدفق الدم وتحسين الوظيفة الجنسية من خلال ثلاث آليات مختلفة تشمل: زيادة مستويات هرمون التستوستيرون وأوكسيد النيتريك، والتي تعتبر ضرورية للإثارة و حدوث الانتصاب، كما أنه يسبب ارتفاع مستويات النواقل العصبية الكolinية الرئيسية المرتبطة بالإثارة الجنسية عند الرجال والنساء.

كما أظهرت الأبحاث أن فيرتا يمتلك تأثيرات مضادة للإرهاق، والتي يمكن أن تكون مفيدة أثناء النشاط الجنسي.

بالإضافة إلى ذلك يحتوي أيضاً على الإستروجين النباتي، الذي يمكن أن يقلل من ترقق العظام لدى النساء بعد سن اليأس.

الاستطبابات:

يستخدم فيرتا لعلاج:

- الاضطراب الجنسي (انخفاض الرغبة الجنسية).
- الاضطراب الجنسي الناتج عن اضطراب وظيفة البروستات.

- تراجع الشعور الجنسي عند الرجل والمرأة.

مضادات الاستطباب:

فرط الحساسية تجاه المادة الفعالة أو أي من مكونات المستحضر.

التحذيرات والاحتياطات:

- الاضطرابات النزفية: قد يبطئ فيرتا من تخثر الدم. وهذا بدوره قد يزيد من خطر النزيف. يجب التوقف عن تناول فيرتا قبل أسبوعين على الأقل من العمليات الجراحية.

- يعمل فيرتا مثل الإستروجين وبالتالي يمكن أن يزيد من مستويات الإستروجين لدى بعض النساء.
- عند الأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم، قد يؤدي استخدام فيرتا إلى انخفاض شديد في ضغط الدم وزيادة خطر الإغماء.

الحمل والإرضاع:

الحمل: لا ينبغي استخدام فيرتا أثناء الحمل.

الإرضاع: لا ينصح بالرضاعة الطبيعية للنساء اللواتي يتناولن فيرتا.

القيادة واستخدام الآلات:

ليس لفيرتا أي تأثيرات على القدرة على القيادة واستخدام الآلات.

التفاعلات الدوائية:

- قد يؤدي استخدام فيرتا بشكل متزامن مع أدوية ارتفاع ضغط الدم إلى انخفاض شديد في ضغط الدم.

- قد يؤدي تناول فيرتا مع مضادات التخثر/ مضادات تكس الصفائح إلى زيادة فرص حدوث الكدمات والنزيف.

التأثيرات الجانبية:

استخدام فيرتا حسب الجرعة الموصوفة آمن وليس له أية آثار جانبية. ولكن عند استخدامه بجرعات عالية وفترات طويلة قد يسبب الدوخة والقيء وجفاف الفم والعطش ونزيف الأنف.

الجرعة والاستعمال:

للرجال: الجرعة الموصى بها ١-٢ كبسولة قبل الجماع بـ ٩٠ دقيقة، يمكن زيادة الجرعة إلى ٣ كبسولات عند الحاجة.

للنساء: كبسولة واحدة قبل الجماع بـ ٣٠ دقيقة.

الحفظ:

يحفظ بعيداً عن متناول أيدي الأطفال. يُحفظ في درجة حرارة أقل من ٣٠ °م.

التعبئة:

كل عبوة كرتونية فيرتا تحتوي على: ٤ كبسولات ضمن شريط بليستر واحد.

كل عبوة كرتونية فيرتا تحتوي على: ١٠ كبسولات ضمن شريط بليستر واحد.

الدواء مستحضر بوتر على صيغة، وإستعماله خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.
البريد بادية وصفة الطبيب، وطريقة الإستعمال الموصى من عليها والتعليمات الصيادلة
التي صر فيها ذلك، والتعليق، والصيادلة هذا الأخير أن في الدواء وينبغي استخدامه.
لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية.
لا تكرر الأدوية تحتوي على الأطفال.
محيط وزراء الصحة العرب، والحد الصيدلة العرب.

ريفا فارما للصناعات الدوائية - إدلب - سوريا