

Care-Argi

Vials For Oral Use



Composition:

Each Care-Argi Vial For Oral Use of 10 ml contains: Arginine Aspartate 5 g (Equivalent to 2.835 g of Arginine).

Pharmaceutical Group:

Dietary Supplement.

Pharmacological Properties & Mechanism of Action:

Arginine is an essential amino acid that is required during periods of maximal growth, severe stress, and injury.

Arginine stimulates the release of growth hormone and increases muscle mass during growth. Body uses Arginine to produce nitric oxide, which dilates blood vessels and inhibits platelet adhesion and aggregation. Arginine is essential in the formation of sperm and can improve sperm count and motility.

Pharmacokinetics:

There are no studies on the pharmacokinetics of Arginine administered orally.

Indications:

- Prevention of deficiency states of amino acids caused by an insufficient protein intake due to vegetarian diets, lack of appetite and convalescence.
- Fatigue, weakness, and colds, and to improve the performance of athletes.
- Cases of delayed physiological growth as a result of a defect or deficiency of growth hormone, but with the growth hormone remaining functionally effective
- Erectile dysfunction or poor sperm formation and movement and inappropriate sperm production

Contraindications:

- Hypersensitivity or allergy to any of the components of Care-Argi.
- Severe renal or liver failure.

Warnings & Precautions:

- Patients with urinary retention problems must only take Care-Argi under medical control.
- Care-Argi must not be taken continuously. If symptoms worsen or persist, consult with your doctor.

Pregnancy & Lactation:

Pregnancy: If you are pregnant or you think you could be pregnant, consult your doctor before taking

Care-Argi. The use of drugs during pregnancy can be dangerous for the embryo or fetus and must be monitored by your doctor.

Lactation: Nursing women must not use Care-Argi without consulting the doctor.

Drug Interactions:

No known dangerous interactions with other medications have been reported. Arginine may interact with Isosorbide Dinitrate, Nitroglycerin, or Nicorandil.

A doctor or pharmacist should be consulted if any of these medications are taken simultaneously with Arginine.

Side Effects:

Some side effects may appear, such as headache, nausea, vomiting, numbness, and allergic reactions. If any other side effects appear, you must consult a doctor.

Driving & Using Machines:

No significant effects of Care-Argi on driving or using machines have been reported.

Dosage & Administration:

- Care-Argi is taken orally only.
- Children under 2 years: The use of this drug is not recommended.
- Children from 2 to 6 years: only if prescribed by the doctor.
- Children from 6 to 12 years: 1 vial or the dose recommended by the doctor.
- Above 12 years and Adults: 1 vial twice a day.
- The contents of the vial can be taken diluted with some water or fruit juice at the end of the main meals.

Overdose:

- Continued or accidental intake of large doses may cause gastrointestinal discomfort (diarrhea, nausea, vomiting).
- In case of overdose or accidental intake, consult the doctor.

Storage:

Store at a temperature below 30 °C.
Keep out of reach of children.

Packaging:

Each Care-Argi carton box contains 10 Glass Vials of 10 ml.

*A medication is a product which affects your health, and it's consumption contrary to instructions is dangerous for you.
- Follow strictly the doctor's prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medication.
- The doctor and the pharmacist experts in medicine, it's benefits and risks.
- Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.
KEEP THE MEDICAMENTS OUT OF REACH OF CHILDREN
Council of Arab Health Ministers- Union of Arab Pharmacies

Reva Pharma for Pharmaceutical Industries - Idlib - Syria

P01600 / R02



كير - أرجي

حبابات معدة للاستعمال الفموي

التركيب:

كل حبة كير - أرجي معدة للاستعمال الفموي سعة ١٠ مل تحتوي على:

أرجينين أسبارتات ٥ غ (ما يعادل ٨٣٥، ٢ غ أرجينين).
الزمرة الدوائية:

متمم غذائي.

الخصائص الدوائية وآلية التأثير:

الأرجينين هو حمض أميني أساسي مطلوب خلال ذروة فترات النمو والإجهاد الشديد والإصابة.

يحفز الأرجينين تحرر هرمون النمو ويزيد الكتلة العضلية أثناء النمو، ويستعمل الجسم الأرجينين في صنع أكسيد

النتريك الموسع للأوعية الدموية والمثبط للتصاق

وتكدس الصفائح. يعتبر الأرجينين ضرورياً في تشكيل الحيوانات المنوية ويمكن أن يحسن من تعدادها وحركتها.

الحرائك الدوائية:

لا يوجد دراسات حول الحركية الدوائية للأرجينين المعطى فمواياً.

الاستقطابات:

الوقاية من حالات نقص الأحماض الأمينية الناجمة عن عدم تناول كمية كافية من البروتين بسبب اتباع نظام غذائي نباتي، قلة الشهية، والنقاهة.

- التعب والوهن ونزلات البرد ولتحسين أداء الرياضيين.

- حالات تأخر النمو الفيزيولوجي نتيجة خلل أو نقص

هرمون النمو ولكن مع بقاء هرمون النمو فعال وظيفياً.

- ضعف الانتصاب وضعف تشكيل وحركة الحيوانات

المنوية وإنتاج الحيوانات المنوية غير الملائم.

مضادات الاستقطاب:

- فرط الحساسية أو الحساسية لأي من مكونات كير - أرجي.

- الفشل الكلوي أو الكبد الشديد.

التحذيرات والاحتياطات:

- يجب على المرضى الذين يعانون من مشاكل احتباس

البول أن يتناولوا كير - أرجي فقط تحت المراقبة الطبية.

- لا ينبغي أن يؤخذ كير - أرجي بشكل مستمر. في حال

استمرار أو تفاقم الأعراض، استشر طبيبك.

الحمل والرضاعة:

الحمل: إذا كنتِ حاملاً أو تعتقدين أنك حامل، استشري

طبيبك قبل تناول كير - أرجي. إن استخدام الأدوية

أثناء الحمل يمكن أن يشكل خطورة على الجنين ويجب

مراقبته من قبل الطبيب.

الإرضاع: يجب على النساء المرضعات عدم استخدام

كير - أرجي دون استشارة الطبيب.

التداخلات الدوائية:

لم يتم الإبلاغ عن أية تداخلات خطيرة مع أدوية

أخرى، قد يتداخل الأرجينين مع إيزوسوربيد ذي نترات،

نتروغليسرين، نيكورانديل، يجب استشارة الطبيب أو

الصيدلاني في حال تناول أي من هذه الأدوية بشكل

متزامن مع الأرجينين.

التأثيرات الجانبية:

قد تظهر بعض التأثيرات الجانبية مثل صداع، غثيان،

إقياء، خدر وردود فعل تحسسية، في حال ظهور أي

تأثيرات جانبية أخرى يجب استشارة الطبيب.

القيادة واستخدام الآلات:

لم يتم الإبلاغ عن أي آثار كبيرة لكير - أرجي على

القيادة أو استخدام الآلات.

الجرعة والاستعمال:

● يتم تناول كير - أرجي عن طريق الفم فقط.

- الأطفال بعمر أقل من سنتين: لا ينصح باستخدام هذا

الدواء.

- الأطفال بعمر من ٢ إلى ٦ سنوات: فقط في حال

وصفه من قبل الطبيب.

- الأطفال بعمر من ٦ إلى ١٢ سنة: حبة واحدة أو

الجرعة الموصى بها من قبل الطبيب.

- الأطفال بعمر فوق ١٢ سنة والبالغين: حبة واحدة

مرتين يومياً.

● يمكن تناول محتويات الحبة ممددة بالقليل من الماء

أو عصير الفاكهة في نهاية الوجبات الرئيسية.

فرط الجرعة:

- قد يؤدي تناول جرعات كبيرة بشكل مستمر أو

عرضي إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي (الإسهال

والغثيان والقيء).

- في حال تناول جرعة زائدة أو تناوله عن طريق

الخطأ، يجب استشارة الطبيب.

الحفظ:

يحفظ في درجة حرارة أقل من ٣٠ °م.

يحفظ بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.

التعبئة:

كل عبوة كرتونية كير - أرجي تحتوي على ١٠ حبات

زجاجية سعة ١٠ مل.

لواء استعمار - دار على حملك واسمك خلال التليغات بعرض الحظر
الصم فادى وصاية الطبيب وطريق الاستعمال الموصى من عليها لمرضى الحظر
نصرها لك ، والشهيد والصبي لها الخبر ان في الدواء ويضعه وحرم
لأقر صرف الدواء دون وصفة طبية
لواء استعمار في العراق
مجلس وزراء الصحة العرب والحد للصحة العرب

رِيشَا هَارِمَا للصناعات الدوائية - إدلب - سوريا