

REVAFURYL

Oral Suspension - Capsule



Composition:

Oral Suspension: Each 5 ml of REVAFURYL Oral Suspension contains Nifuroxazide 218 mg equivalent to 200 mg / 5 gr of suspension.

Capsules: Each REVAFURYL Capsule contains Nifuroxazide 200 mg.

Pharmacological Properties:

Nifuroxazide is an antibacterial belonging to the nitrofuran group. It has an Intestinal antibacterial effect by direct contact with the inner lumen of the intestine, as it is poorly absorbed from the gastro-intestinal tract.

Indications:

REVAFURYL is indicated in the following cases:

- Acute diarrhea of bacterial origin.
- Inflammatory bowel.
- Acute and chronic colitis.
- As an intestinal disinfectant in all other types of diarrhea and intestinal infections.
- Prevention of infection of the intestine with opportunistic germs.

Contraindications:

- Hypersensitivity to nitrofurans, nifuroxazide, or any of the components of the product.
- Premature infants and newborns under the age of one month.

Warnings & Precautions:

- If there is blood or mucus associated with the stool.
- If there is a fever, vomiting, or other associated digestive disturbances.
- You should see a doctor if the diarrhea continues after three days of starting treatment.
- Nifuroxazide can cause acute pancreatitis, so if you see the following symptoms: (nausea, Vomiting accompanied by abdominal pain) treatment should be stopped immediately and a doctor should be consulted.
- Nifuroxazide does not improve rehydration, so its use must be accompanied by a specific dietary schedule to prevent dehydration and loss of minerals and vitamins, it is recommended to eat rice, bananas, grilled meat and mint tea in the event of diarrhea, and it is preferable to stay away from milk and its derivatives.

Pregnancy & Lactation:

Pregnancy: Although studies on experimental animals exclude the distorting effect of fetuses when using nifuroxazide, there are no adequate studies to prove this, it is preferable not to use nifuroxazide during pregnancy without consulting a doctor, and treating diarrhea in pregnant women by modifying the food intake only.

Lactation: A nursing woman can continue breastfeeding her child in the event that her use of nifuroxazide is for a short period (not exceeding three days).

Drug Interactions:

- In order to avoid interactions with other medicines, the doctor or pharmacist must be informed of any other treatment the patient takes it.
- This medicine should not be used concomitantly with the use of sedatives (benzodiazepines: Calpromazepam, alprazolam, lorazepam, midazolam, and others).

Side Effects:

Nifuroxazide can cause the following side effects:

- Quincke's edema: This is angioedema of the tissues under the skin and manifesting an allergic reaction.
- Urticaria.
- Anaphylactic shock.

Dosage & Administration:

Children over two years: 5 ml of the suspension 3 times a day, for 3 days.

Adults: one capsule 4 times a day.

- The maximum daily dose of nifuroxazide is 800 mg.
- The treatment period should not last more than 7 days.
- It is not recommended for use in children under 2 years of age.
- The use of the medicine is not related to eating (it can be used before or after meals).

Storage:

Store in a dry place at a temperature below 25 °C and protect from light.

Packaging:

Oral Suspension: Each carton box REVAFURYL Oral Suspension contains amber glass bottle of 100 ml.

Capsules: Each carton box REVAFURYL Capsules contains 20 Capsules in two blister strips.



ريفافوريل

معلق فموي - كبسول

التَّرْكيب:

المعلق الفموي: كل ٥ مل ريفافوريل معلق فموي
تحتوي على نيفوروكسازيد ٢١٨ ملغ ما يعادل ٢٠٠
ملغ / ٥ غ من المعلق.

الكبسول: كل كبسولة ريفافوريل تحتوي على
نيفوروكسازيد ٢٠٠ ملغ.

الخصائص الدوائية:

نيفوروكسازيد هو مضاد جرثومي ينتمي إلى مجموعة
النيتروفوران، يمتلك تأثيراً مضاداً للجراثيم المعوية
عن طريق التماس المباشر مع اللعنة الداخلية للأمعاء،
كونه ضعيف الامتصاص من السبيل المعدي المعوي.

الاستطبابات:

يُستطب ريفافوريل في الحالات التالية:

- الإسهال الحاد ذو المنشأ الجرثومي.
- التهاب الأمعاء.
- التهابات القولون الحاد والمزمن.
- كمظهر معوي في كل أنواع الإسهالات الأخرى
وأخماج الأمعاء.
- الوقاية من إصابة الأمعاء بالجراثيم الانتهازية.

مضادات الاستطباب:

- فرط الحساسية تجاه النيتروفوران أو النيفوروكسازيد
أو أي من مكونات المستحضر.
- الحُدَج والأطفال حديثي الولادة دون عمر الشهر.

التحذيرات والاحتياطات:

- في حال وجود دم أو مخاط مترافق مع البراز.
- في حال وجود حمى أو إقياءات أو اضطرابات
هضمية أخرى مترافقة.
- يجب مراجعة الطبيب في حال استمرار الإسهال
بعد ثلاثة أيام من بدء العلاج.

- يمكن أن يسبب النيفوروكسازيد التهاب البنكرياس
الحاد، لذلك في حالة مشاهدة الأعراض التالية:
(غثيان، إقياء مترافق مع ألم في البطن) يجب فوراً
إيقاف المعالجة ومراجعة الطبيب.

- نيفوروكسازيد لا يحسن من الإماهة، لذلك يجب أن
يترافق استخدامه مع جدول غذائي محدد لمنع التجفاف
وفقدان المعادن والفيتامينات، يُنصح بتناول الأرز والموز
واللحوم المشوية والشاي بالنعناع في حالة الإصابة
بالإسهال، وبفضل الابتعاد عن الحليب ومشقاته.

الحمل والإرضاع:

الحمل: على الرغم من أن الدراسات على حيوانات

التجربة تستبعد التأثير المشوه للأجنة عند استعمال
النيفوروكسازيد إلا أنه لا يوجد دراسات كافية لإثبات
ذلك، يفضل عدم استخدام نيفوروكسازيد خلال الحمل
دون استشارة الطبيب، وعلاج الإسهال لدى الحامل
من خلال تعديل الوارد الغذائي فقط.

الإرضاع: يمكن للمرضع متابعة إرضاع طفلها في حال
كون استخدامها لنيفوروكسازيد لمدة قصيرة (لا تتجاوز
ثلاثة أيام).

التداخلات الدوائية:

- من أجل تجنب التداخلات مع أدوية أخرى، يجب إبلاغ
الطبيب أو الصيدلي عن أي علاج آخر يتناوله المريض.
- يجب عدم استخدام هذا الدواء بشكل مترافق مع
استخدام المهدئات (البنزوديازيبينات: كالبرومازيبام
والبرازولام ولورازيبام وميدازولام وغيرها).

التأثيرات الجانبية:

- يمكن أن يسبب نيفوروكسازيد التأثيرات الجانبية التالية:
- وذمة كوينك: وهي وذمة وعائية تصيب الأنسجة
تحت الجلد وتظهر بتفاعل تحسسي.
- الشرى.
- الصدمة التأقية.

الجرعة والاستعمال:

الأطفال فوق السنتين: ٥ مل من المعلق ٣ مرات في
اليوم لمدة ثلاثة أيام.

البالغون: كبسولة واحدة ٤ مرات في اليوم.

- الحد الأقصى للجرعة اليومية من نيفوروكسازيد هي
٨٠٠ ملغ.

- يجب ألا تدوم فترة المعالجة أكثر من ٧ أيام.
- لا يُنصح باستخدامه عند الأطفال بعمر أقل من سنتين.
- لا علاقة لاستخدام الدواء بتناول الطعام (يمكن
استخدامه قبل أو بعد الوجبات).

الحفظ:

- يُحفظ في مكان جاف بدرجة حرارة أقل من ٢٥ °م،
بعيداً عن الضوء.

التعبئة:

المعلق الفموي: كل عبوة كرتونية ريفافوريل معلق فموي
تحتوي على عبوة زجاجية عاتمة سعة ١٠٠ مل.

الكبسول: كل عبوة كرتونية ريفافوريل كبسول
تحتوي على ٢٠ كبسولة ضمن شريطين بليستر.