

Composition:

Each 100 ml of BENZO contains:

Benzyl Benzoate 25.0 %w/v.

Mechanism of Action:

Benzyl benzoate is a Parasiticide that causes scabies and pediculosis infestation and is used in their treatment.

Pharmacokinetics:

Absorbed benzyl benzoate is rapidly bio-transformed to hippuric acid, which is excreted in the urine.

Indications:

BENZO is used in the treatment of scabies and pediculosis.

Contraindications:

Hypersensitivity to benzyl benzoate or any component of the product.

Warning & Precautions:

Local erythema and irritation may occur. The lotion is irritating to the eyes. Protect your eyes during application.

Pregnancy & Lactation:

Although no studies on the effects on human pregnancy or lactation have been carried out, the drug is for topical use and is unlikely to represent a hazard to the pregnant or lactating patient. You should consult your doctor before starting to use this medicine.

Drug Interactions:

There are no reports of drug interactions.

Side Effects:

BENZO may cause mild skin irritation or a short-term burning sensation. This side effect may be more severe in patients who are allergic. If this effect is severe, the preparation should be washed off immediately with soap and water. Symptoms such as difficulty urinating and seizures or convulsions have been reported in infants with excessive use of the preparation. If any of these symptoms occur, wash off the preparation and contact your doctor immediately.

Driving & Using Machines:

BENZO is not expected to affect the ability to drive and use machines.

Dosage & Administration:

Shake the bottle before application or dilution. For Topical use, Cutaneous use.

Scabies: Apply thoroughly to the entire body at night from the soles of the feet, omitting the head and neck, for 2 consecutive nights. The lotion is left in place for 8-12 hours and may be followed by a repeated application at night 7 days later. In the case of lesions affecting the head, face and/or neck, it may be necessary to consult a healthcare professional before using this product. Thorough bathing with complete changes of clothing and bedding should follow each application.

All contacting clothes and bedding should be washed and/or cleaned.

Pediculosis: Apply to the affected area and allow to remain on for 24 hours, then wash thoroughly. In severe cases 2 or 3 treatments may be repeated after 7 and 14 days. Thorough bathing with complete changes of clothing should follow each application. All contacting clothing and bedding should be washed and or cleaned.

Child and Infant Dosage Instructions: BENZO may be diluted with an equal quantity of water for older children and with three parts of water for infants.

Overdose:

Treatment of poisoning in the event of an overdose on the skin includes washing and symptomatic measures.

Storage:

Keep out of reach of children. Store below 25 °C.

You should not use BENZO after the expiry date.

Packaging:

Each BENZO carton box contains amber glass bottle of 100 ml or transparent plastic bottle of 200 ml.



بنزو غسول

الجرعة والاستعمال:

رج العبوة جيداً قبل الاستخدام أو التمديد.

للاستخدام الموضعي، الاستخدام على الجلد.

الجرب: يتم تطبيق المستحضر ليلاً حيث يوضع بشكل جيد على الجسم بالكامل بدءاً من باطن القدمين، مع إغفال منطقة الرأس والرقبة، وذلك لمدة ليلتين متتاليتين. يُترك المستحضر في مكان التطبيق لمدة ٨-١٢ ساعة ويمكن أن يتبعه تطبيق متكرر ليلاً بعد ٧ أيام.

في حالة الآفات التي تصيب الرأس و/أو الوجه و/أو الرقبة، قد يكون من الضروري استشارة أخصائي الرعاية الصحية قبل استخدام هذا المنتج. يجب أن يتبع كل تطبيق الاستحمام الشامل مع تغيير الملابس وأغطية الفراش. يجب غسل و/أو تنظيف جميع الملابس والمفروشات الملامسة.

القمل: يتم تطبيق الدواء على المنطقة المصابة ويُترك لمدة ٢٤ ساعة، ثم يُغسل بشكل جيد. في الحالات الشديدة، يمكن تكرار المعالجة مرتين إلى ثلاث مرات بعد ٧ و١٤ يوماً. يجب أن يتبع كل تطبيق، الاستحمام الشامل مع تغيير الملابس بالكامل. يجب غسل جميع الملابس وأغطية الفراش الملامسة.

تعليمات جرعة الأطفال والرضع: يمكن تمديد بنزو بكمية مساوية من الماء للأطفال الأكبر سناً وبثلاثة أضعاف من الماء للأطفال الرضع.

فرط الجرعة:

يشمل علاج التسمم في حال تطبيق جرعة زائدة على الجلد، إجراء الغسيل واتخاذ تدابير المعالجة العرضية.

الحفظ:

يحفظ بعيداً عن متناول أيدي الأطفال. يُحفظ في درجة حرارة أقل من ٢٥°م.

يجب عدم استخدام بنزو بعد تاريخ انتهاء الصلاحية.

التعبئة:

كل عبوة كرتونية بنزو تحتوي على عبوة زجاجية عاتمة سعة ١٠٠ مل أو عبوة بلاستيكية شفافة سعة ٢٠٠ مل.

الدواء مستحضر بوتر على مسك، وإمالة خلافاً لتعليمات بعض الحكومات
التي تدعي وصفة الطبيب، وطريقة الاستعمال الممنوعة من عليها وتعليمات الصيدلي
التي صرنا بها، كالتطبيق والصيدلي هذا الغيران في الدواء وينفعه ويضره،
لأنه صرنا به الدواء بوتر وصفة طبية
لأنه صرنا به الدواء بوتر وصفة طبية
محظون وزراء الصحة العرب والحد الصيدلة العرب.

ريضا فارما للصناعات الدوائية - ادلب - سوريا

000332 / R02

التركيب:

كل ١٠٠ مل بنزو تحتوي على:

بنزوات البنزيل ٢٥ ٪ وزن/حجم.

آلية التأثير:

بنزوات البنزيل مبيد للطفيليات المسببة للإصابة بالجرب والقمل ويستخدم في علاجهما.

الحرائك الدوائية:

يتم تحويل بنزوات البنزيل الممتص سريعاً إلى حمض الهيپيوريك الذي يُطرح في البول.

الاستطبابات:

يستخدم بنزو في علاج الجرب والقمل.

مضادات الاستطباب:

فرط الحساسية لمادة بنزيل بنزوات أو أي من مكونات المستحضر.

التحذيرات والاحتياطات:

- قد يحدث تهيج واحمرار موضعي.
- المستحضر مهيج للعيون. احم عينيك أثناء التطبيق.

الحمل والإرضاع:

على الرغم من عدم إجراء دراسات حول الآثار المترتبة على الحمل أو الإرضاع لدى الإنسان، إلا أن الدواء للاستخدام الموضعي ومن غير المحتمل أن يمثل خطراً على المريضة الحامل أو المرضعة. يجب استشارة طبيبك قبل البدء باستعمال هذا الدواء.

التداخلات الدوائية:

لا توجد تقارير عن التداخلات الدوائية.

التأثيرات الجانبية:

قد يسبب بنزو تهيجاً خفيفاً للجلد أو إحساساً حارقاً قصير الأمد. قد يكون هذا الغرض الجانبي أكثر حدة في المرضى الذين يعانون من الحساسية. إذا كان هذا التأثير شديداً، يجب غسل المستحضر فوراً بالماء والصابون. تم الإبلاغ عن حدوث بعض الأعراض مثل صعوبة في التبول ونوبات أو تشنجات عند الرضع في حال الإفراط في استخدام المستحضر. في حالة حدوث أي من هذه الأعراض، اغسل المستحضر واتصل بطبيبك على الفور.

القيادة واستخدام الآلات:

من غير المتوقع أن يؤثر بنزو على القدرة على القيادة واستعمال الآلات.