

## Composition:

Each RECSIL Suppository contains:

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Oxomemazine     | 3.3 mg.  |
| Guaifenesin     | 66.6 mg. |
| Sodium Benzoate | 66.6 mg. |
| Paracetamol     | 66.6 mg. |

## Pharmacological Properties:

Oxomemazine: an antihistamine from the family of phenothiazines. It has antitussive and sedative properties.

Paracetamol: is an effective analgesic and antipyretic.

Guaifenesin: is an expectorant that works by increasing the volume and reducing the viscosity of bronchial secretions.

Sodium Benzoate: dissolves phlegm and increases the fluidity of bronchial secretions.

## Pharmacokinetics:

Guaifenesin is absorbed from the gastrointestinal tract and is excreted in the urine after metabolism. Paracetamol is well absorbed from the gastrointestinal tract. It reaches its highest concentration in plasma after about 10 to 60 minutes of oral administration and spreads through most body tissues. It is metabolized mainly in the liver and excreted in the urine as sulfate and glucuronide conjugates. Less than 5% of Paracetamol is excreted in an unchanged form. Sodium Benzoate is absorbed from the gastrointestinal tract and is combined with glycine in the liver, forming hyper uric acid, which is rapidly excreted in urine.

## Indications:

RECSIL suppositories are used to treat symptomatic treatment of non-productive cough, particularly irritative and allergic types of coughs.

## Contraindications:

RECSIL suppositories are not indicated in children with:

- Respiratory disorders.
- Hepatic cellular insufficiency.
- Hypersensitivity to any of the components of the preparation.
- Do not give to children under two years of age.

## Warnings & Precautions:

RECSIL suppositories should be used with cau-

tion in the following cases:

- It is necessary to refer to the doctor if the cough continues for more than a few days.
- Productive coughs, which are a fundamental element of bronchopulmonary defense.
- Bronchial asthma or gastroesophageal reflux disease should be ruled out before using RECSIL suppositories in children.
- In subjects with certain cardiovascular conditions, due to the tachycardia and hypertensive effects of phenothiazines
- Epilepsy, hepatic insufficiency and renal insufficiency.

## Side Effects:

In very rare cases, dry mouth, drowsiness, urinary retention, and digestive disturbances may occur. These symptoms will soon disappear if the drug is stopped, or the dose is reduced.

## Drug Interactions:

Avoid concurrent use of RECSIL suppositories with the following medicines:

Tricyclic antidepressants, antiparkinsonian anticholinergics, antispasmodics, disopyramide, neuroleptic phenothiazines: Additional atropine-like side effects such as urinary retention, constipation, dry mouth.

Antidepressants with sedative effects, barbiturates and benzodiazepines: Increased depression.

## Dosage & Administration:

- Infants up to 30 months: 1 suppository in the morning and evening.
- Children from 30 months to 12 years: one suppository three times daily.

## Storage:

Store at a temperature below 25°C.

Keep out of reach of children.

## Packaging:

Each RECSIL carton box contains 10 Suppositories in two PVC/PE strips.



## ريكسيل

تحاميل

### التَّركيب:

كلَّ تحميلية ريكسيل تحتوي على:

أوكسيممازين ٣,٣ ملغ.

غوايفينيزين ٦٦,٦ ملغ.

بنزوات الصوديوم ٦٦,٦ ملغ.

باراسيتامول ٦٦,٦ ملغ.

### الخصائص الدوائية:

أوكسيممازين: مضادٌ هستامينيٌّ من عائلة الفينوثيازين. يمتلك خصائص مضادة للسعال ومهدئة.

الباراسيتامول: مسكنٌ فعالٌ وخافض للحرارة.

غوايفينيزين: مقشع يعمل عن طريق زيادة الحجم وتقليل لزوجة إفرازات الشعب الهوائية.

بنزوات الصوديوم: يعمل على إذابة البلغم وزيادة سيولة إفرازات الشعب الهوائية.

### الحرارك الدوائية:

يُمتص غوايفينيزين من الجهاز الهضمي ويُطرح في البول بعد خضوعه للاستقلاب. يُمتص الباراسيتامول بشكل جيد من القناة الهضمية. يصل إلى أعلى تركيز له في البلازما بعد حوالي ١٠ إلى ٦٠ دقيقة من تناوله عن طريق الفم وينتشر إلى معظم أنسجة الجسم. يتم استقلابه بشكل رئيسي في الكبد ويُطرح في البول على شكل مستقلبات كيريتية وغلوكورونية، يتم إخراج أقل من ٥٪ من الباراسيتامول بشكل غير متغير. تُمتص بنزوات الصوديوم من القناة الهضمية ويتم ربطه مع الجلبيين في الكبد، مما يؤدي إلى تكوين حمض اليوريك، والذي يتم إخراجها بسرعة في البول.

### الاستطبابات:

تستخدم تحاميل ريكسيل لعلاج أعراض السعال المزعج غير المنتج، وخاصة السعال التحسسي والتهيجي.

### مضادات الاستطباب:

لا تُستطب تحاميل ريكسيل لدى الأطفال الذين يعانون من:

- اضطرابات تنفسية.

- قصور كبدِي خلوي.

- فرط الحساسية تجاه أحد مكونات المستحضر.

- لا يعطى للأطفال بعمر أقل من سنتين.

### التحذيرات والاحتياطات:

يجب استخدام تحاميل ريكسيل بحذر في الحالات التالية:

- يجب مراجعة الطبيب إذا استمر السعال لأكثر من عدة أيام.

- السعال المنتج، وهو عنصر أساسي في الدفاع القسبي الرئوي.

- يجب استبعاد الربو القسبي أو داء الارتجاع المعدي المريئي قبل استخدام تحاميل ريكسيل لدى الأطفال.

- عند الأشخاص الذين يعانون من بعض أمراض القلب والأوعية الدموية، بسبب تأثيرات تسرع القلب وارتفاع ضغط الدم الناتجة عن الفينوثيازين.

- الصرع والقصور الكبدِي والقصور الكلوي.

### التأثيرات الجانبية:

في حالات نادرة جداً يمكن حدوث جفاف في الفم، شعور بالتعاس، احتباس بول، اضطرابات هضمية، سرعان ما تزول هذه الأعراض في حال إيقاف الدواء أو تخفيف الجرعة.

### التداخلات الدوائية:

تجنب استخدام المتزامن لتحاميل ريكسيل مع الأدوية التالية:

مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقة، مضادات الكولين المضادة للباركنسون، مضادات التشنج، الديسوبيراميد، الفينوثيازينات المضادة للذهان: آثار جانبية إضافية تشبه الأتروبيين مثل احتباس البول، الإمساك، جفاف الفم.

مضادات الاكتئاب ذات التأثيرات المهدئة، الباربيتورات والبنزوديازيبينات: زيادة الاكتئاب.

### الجرعة والاستعمال:

- الرضع حتى ٣٠ شهراً: تحميلية واحدة صباحاً ومساءً.

- الأطفال من ٣٠ شهراً حتى ١٢ سنة: تحميلية واحدة ثلاث مرّات يومياً.

### الحفظ:

يحفظ في درجة حرارة أقل من ٢٥ °م.

يحفظ بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.

### التعبئة:

كل عبوة كرتونية ريكسيل تحتوي ١٠ تحاميل ضمن شريطين PVC\PE.

الدواء مستحضر بوتر على صيغة وإمالة خالفاً لتعليمات بروتوكول الخطر الذي يباع وصفه الطبيب، وطريقة الاستعمال الممنوع من عليها تعليمات الصيادلة التي صرفها لك ، فالتعليمات الصيادلة هي الغير ان في الدواء وينبغي وعصره ، لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية  
لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية  
محظوظ وزارة الصحة العرب والحد الصيدلة العرب.  
رِفَا فارما للصناعات الدوائية - ادلب - سوريا