

Composition:

Each GLYCERAX Infants - Children Suppository contains: Glycerin 1g (including excipients).

Each GLYCERAX Adults Suppository contains: Glycerin 3g (including excipients).

Pharmacological Properties & Mechanism of Action:

Glycerin belongs to the group of laxatives, and has a mild local irritant effect. It acts as a lubricant and stool softener, as well as by drawing water into the intestines to soften the stool. It is used to relieve occasional constipation, promoting bowel emptying within 15 to 60 minutes after use.

Indications:

GLYCERAX suppositories are used as a laxative, to relieve acute and temporary constipation in infants, children and adults.

Contraindications:

- Patients with hypersensitivity to Glycerin or any of the components of the product.
- People with intestinal obstruction or rectal bleeding.

Warnings & Precautions:

- Do not use GLYCERAX suppositories unless there is actual constipation.
- A doctor should be consulted before using GLYCERAX suppositories if the patient experiences a sudden change in bowel habits for more than two weeks.

Pregnancy & Lactation:

There is no evidence of harmful effects when using GLYCERAX suppositories. However, it is best avoided during the first trimester of pregnancy. It can be used during breastfeeding.

Side Effects:

Sometimes GLYCERAX suppositories may cause abdominal cramps.

Dosage & Administration:

- Use one suppository when necessary, or as directed by the doctor and pharmacist.
- The suppository must be moistened in water before it is inserted.

Overdose:

Glycerin has a mild laxative effect, however, if accidentally swallowed, it is unlikely to cause side effects or that active measures would be required. Accidental ingestion of a large number of suppositories may cause headache, nausea and vomiting, diarrhea, thirst, dizziness, confusion, and arrhythmia may rarely occur.

Storage:

Keep out of reach of children.

Store in a dry place, at a temperature below 25 °C.

Packaging:

Each GLYCERAX Infants - Children carton box contains 10 Suppositories in two PVC/PE strips.

Each GLYCERAX Adults carton box contains 10 Suppositories in two PVC/PE strips.



جليسيراكس تحاميل

التَّركيب:

كل تحميلة جليسيراكس رَضَع - أطفال تحتوي على: غليسيرين ١ غ (مع السواغات).

كل تحميلة جليسيراكس بالغين تحتوي على: غليسيرين ٣ غ (مع السواغات).

الخصائص الدوائية وآلية التأثير:

ينتمي الغليسيرين إلى مجموعة الأدوية الملينة، يمتلك تأثيراً مهيّجاً موضعياً إلى حدٍ ما. يعمل كمزلق وملين للبراز، وكذلك عن طريق سحب الماء إلى الأمعاء لتليين البراز. يستخدم للتخفيف من الإمساك الغَرَضي، مما يعزز إفراغ الأمعاء خلال ١٥ إلى ٦٠ دقيقة بعد الاستخدام.

الاستطبابات:

تستخدم تحاميل جليسيراكس كملين، وذلك للتخفيف من الإمساك الحاد والمؤقت عند الرضع والأطفال والبالغين.

مضادات الاستطباب:

- المرضى الذين يعانون من فرط الحساسية تجاه الغليسيرين أو لأي من مكونات المستحضر.
- الأشخاص الذين يعانون من انسداد معوي أو نزيف مستقيمي.

التحذيرات والاحتياطات:

- لا تُستخدم تحاميل جليسيراكس إلا في حال وجود إمساك فعلي.

- يجب استشارة الطبيب قبل استخدام تحاميل جليسيراكس إذا كان المريض يعاني من تغيير مفاجئ في عادات الأمعاء لمدة تزيد عن أسبوعين.

الحمل والإرضاع:

ليس هناك دليل على وجود تأثيرات ضارة عند استخدام تحاميل جليسيراكس. ومع ذلك، من الأفضل تجنبها خلال الثلث الأول من الحمل. يمكن استخدامها خلال الرضاعة الطبيعية.

التأثيرات الجانبية:

في بعض الأحيان قد تسبب تحاميل جليسيراكس تقلصات في البطن.

الجرعة والاستعمال:

- تُستخدم تحميلة واحدة عند اللزوم، أو حسب إرشادات الطبيب والصيدلاني.

- يجب ترطيب التحميلة في الماء قبل إدخالها.

فرط الجرعة:

الجليسيرين له تأثير ملين خفيف، ومع ذلك، إذا تم ابتلاعه عن طريق الخطأ، فمن غير المرجح أن يسبب أثراً جانبياً أو أن تكون هناك حاجة لاتخاذ تدابير فعالة. قد يؤدي الابتلاع الغَرَضي لعدد كبير من التحاميل إلى الصداع والغثيان والقيء. نادراً ما يحدث الإسهال والعطش والدوخة والارتباك وعدم انتظام ضربات القلب.

الحفظ:

يحفظ بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.

يُحفظ في مكان جاف، بدرجة حرارة أقل من ٢٥ °م.

التعبئة:

كل عبوة كرتونية جليسيراكس رَضَع - أطفال تحتوي

على ١٠ تحاميل ضمن شريطين PVC\PE.

كل عبوة كرتونية جليسيراكس بالغين تحتوي على ١٠

تحاميل ضمن شريطين PVC\PE.